

色。

分布 内蒙古、新疆；中亚地区。

僧夜蛾属 *Leiometopon* Staudinger

Leiometopon Staudinger, 1888, Stett. ent. Zeit. 49: 37.

Type-species: *Leiometopon simyrides* Staudinger.

喙退化，下唇须向前平伸，第三节短小，额有圆突，触角线形较扁，后胸有大毛簇；前翅顶角钝圆，有一副室；后翅5脉细弱，6、7脉共一短柄。

僧夜蛾 *Leiometopon simyrides* Staudinger (图版XXXIV-10)

Leiometopon simyrides Staudinger, 1888, Stett. ent. Z. p. 37. (新疆伊宁)

Leiometopon simyrides: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 172. —Varga, 1976, Ann. Hst. nat. Mus. Nat. Hung. 68: figs. 3, 4. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 246.




图 508 僧夜蛾 *Leiometopon simyrides* Staudinger ♂ 外生殖器

翅展 30—32 mm。头、胸灰白杂浅褐色并有黑点；前翅褐白色，一微黑曲纹自顶角至2脉基部，翅脉黑褐色，剑纹黑色细长，端部前方有一黑褐纹，环纹不显，肾纹扁长，内端尖，黑色，外线黑褐色，外侧一褐带，亚端线不显；后翅微褐；腹部灰褐色。雄蛾前翅剑纹不显。抱钩二叉，背一支长，阴茎端有一列棘形角状器（图 508）。

分布 内蒙古、新疆。