

Xizang. p. 194. ——Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.967.

翅展 34 mm 左右。头部及胸部赭色杂红褐色，下唇须外侧及额两侧暗褐色，颈板近端部有褐线；前翅赭色，除前后缘区外大部带红褐色，中脉白色，后衬褐色，3、4脉白色，其余各脉衬褐色，内线黑色间断为点，外斜至亚中褶，中室端部一黑褐斑，界限不清，外线为一列黑点，外弯成弧形，顶角有一内斜黑褐条纹，端线为一列黑点；后翅淡褐色，端区黑褐色；腹部褐色。

分布 浙江、福建、广西、云南；印度。

赭黄粘夜蛾 *Leucania rufistrigosa* Moore (图版 XXI-5)

Leucania rufistrigosa Moore, 1881, Proc. zool. Soc. Lond. p. 337. (印度)

Cirphis rufistrigosa: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 516, pl. 92, fig. 16. ——Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 49.

Sideridis rufistrigosa: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 94, pl. 12g.

Leucania rufistrigosa: Chen, 1982 Icon. Het. Sin. 3: 308, pl. 92, fig. 2197. ——Chen *et al.*, 1991. Noct. Fn. Xizang. p. 196. ——Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.967.

翅展 34 mm 左右。头部及胸部赭黄色杂以暗褐色，颈板灰色，端部一黑褐线，翅基片外缘带暗褐色，内缘有几个黑点；前翅赭黄色，中室赤褐色，前缘区及后缘区有零星黑点，亚中褶基部带有赤褐色，基线、内线均为几个黑点，中脉端部白色并向前稍钩，中室端部黄白色有赤红红纹，亚端区一列黑点，排成弧形，顶角有一内斜淡黄纹；后翅污褐色；腹部褐色。

分布 湖南、四川、西藏；印度。

播粘夜蛾 *Leucania aspersa* Snellen (图版 XXI-6)

Leucania aspersa Snellen, 1880, Tijds. Ent. pl. 42, pl. 4, fig. 1. (印度尼西亚)

Borolia aspersa: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 566.

Sideridis aspersa: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 98.

Leucania aspersa: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 309 pl. 92, fig. 2208.

翅展 23 mm 左右。头部及胸部淡赭黄色，额有褐纹，颈板有三条横黑线；前翅淡赭黄色，翅脉色浅，均衬以暗褐色，各翅脉间有一暗褐纵纹，中脉明显，在中室端部较粗，其外侧有一暗褐小斑，1脉 1/3 处及 2脉基部后方各有一黑点，外线为一列黑点，顶角至 5脉有一斜影，其后方约成一三角形暗褐区；后翅黄白色，顶角区微带褐色；腹部褐色。

分布 四川；缅甸，印度尼西亚。