

洲粘夜蛾 *Leucania insularis* Butler (图版 XXI-2)

Leucania insularis Butler, 1880. Proc. zool. Soc. Lond. p. 674. (台湾)

Axylia albivena Moore, 1881, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 342.

Axylia irrorata Moore, 1881, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 341.

Cirphis insularis: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 486, pl. 91, fig. 22. —
Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 47.

Sideridis insularis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 93, pl. 12d.

Leucania insularis: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 307. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.965.

翅展 29 mm 左右。头部、胸部及腹部淡赭黄色，下唇须外侧微黑，额两侧有黑斑，颈板有三条黑色横线，翅基片内缘有黑线；前翅赭色，布有褐点，外半部各脉间带褐色，亚中褶内半有一黑纵纹，中脉较白，两侧衬黑色，环纹及肾纹黄白色，肾纹后半有一黑点，外线为一列黑点，排成弧形，端线为一列黑点；后翅白色，端区微带褐色。

分布 湖南、台湾、广东、广西、海南、云南；印度，印度尼西亚。

格粘夜蛾 *Leucania tessellum* (Draudt) (图版 XXI-3)

Hyssia tessellum Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 41, pl. 2, fig. 21. (云南丽江)

Hermonassa tessellum: Boursin. 1967, Z. Wien. ent. Ges. 52: 28.

Hyssia tessellum: Chen, 1993, Ins. Hengduan Mts. p. 1014.

Leucania tessellum: Poole, 1989, Lep. Cat. p. 587.

翅展 35 mm。头部与胸部黄白色，下唇须外侧黑褐色，端部黑色，颈板基部黄色，端部黄白色，中部有黑横纹；前翅黄白色，布有黑色细点，基线粗，黑色，内线黑色，带状，多线黑色，带状，内、外线间在中褶处有一黑纵条相连，环、肾纹间有一黑弧纹，翅后缘有一黑纵条，自内线稍内至外线，顶角有一黑色斜纹伸达外线，缘毛黑色与黄白色相间；后翅黄白色，大部带有黑色；腹部黄白色。

分布 云南。

德粘夜蛾 *Leucania dharmia* Moore (图版 XXI-4)

Leucania dharmia Moore, 1881, Proc. zool. Soc. Lond, p. 338, pl. 37, fig. 17. (大吉岭)

Leucania rufescens Moore, 1882, Lep. Atk. p. 102.

Cirphis dharmia: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 516, pl. 92, fig. 15. —
Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 49.

Sideridis dharmia: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 94.

Leucania dharmia: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 308. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn.

Xizang. p. 194. ——Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.967.

翅展 34 mm 左右。头部及胸部赭色杂红褐色，下唇须外侧及额两侧暗褐色，颈板近端部有褐线；前翅赭色，除前后缘区外大部带红褐色，中脉白色，后衬褐色，3、4脉白色，其余各脉衬褐色，内线黑色间断为点，外斜至亚中褶，中室端部一黑褐斑，界限不清，外线为一列黑点，外弯成弧形，顶角有一内斜黑褐条纹，端线为一列黑点；后翅淡褐色，端区黑褐色；腹部褐色。

分布 浙江、福建、广西、云南；印度。

赭黄粘夜蛾 *Leucania rufistrigosa* Moore (图版 XXI-5)

Leucania rufistrigosa Moore, 1881, Proc. zool. Soc. Lond. p. 337. (印度)

Cirphis rufistrigosa: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 516, pl. 92, fig. 16. ——Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 49.

Sideridis rufistrigosa: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 94, pl. 12g.

Leucania rufistrigosa: Chen, 1982 Icon. Het. Sin. 3: 308, pl. 92, fig. 2197. ——Chen *et al.*, 1991. Noct. Fn. Xizang. p. 196. ——Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.967.

翅展 34 mm 左右。头部及胸部赭黄色杂以暗褐色，颈板灰色，端部一黑褐线，翅基片外缘带暗褐色，内缘有几个黑点；前翅赭黄色，中室赤褐色，前缘区及后缘区有零星黑点，亚中褶基部带有赤褐色，基线、内线均为几个黑点，中脉端部白色并向前稍钩，中室端部黄白色有赤红红纹，亚端区一列黑点，排成弧形，顶角有一内斜淡黄纹；后翅污褐色；腹部褐色。

分布 湖南、四川、西藏；印度。

播粘夜蛾 *Leucania aspersa* Snellen (图版 XXI-6)

Leucania aspersa Snellen, 1880, Tijds. Ent. pl. 42, pl. 4, fig. 1. (印度尼西亚)

Borolia aspersa: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 566.

Sideridis aspersa: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 98.

Leucania aspersa: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 309 pl. 92, fig. 2208.

翅展 23 mm 左右。头部及胸部淡赭黄色，额有褐纹，颈板有三条横黑线；前翅淡赭黄色，翅脉色浅，均衬以暗褐色，各翅脉间有一暗褐纵纹，中脉明显，在中室端部较粗，其外侧有一暗褐小斑，1脉 1/3 处及 2脉基部后方各有一黑点，外线为一列黑点，顶角至 5脉有一斜影，其后方约成一三角形暗褐区；后翅黄白色，顶角区微带褐色；腹部褐色。

分布 四川；缅甸，印度尼西亚。