

Leucania prominens Moore, 1881, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 339.

Hyphilare duplicata var. *limbopunctata* Strand, 1920, Arch. Nat. 84A (12): 105.

Cirphis duplicata: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 506.

Hyphilare duplicata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 91.

Leucania duplicata: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 307. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.195. —Chen, 1992, in Peng. Icon. For. Ins. Hunan p.966.

翅展 31 mm 左右。头部及胸部黄白色，下唇须外侧及额两侧褐色，颈板有三条褐色横线；前翅淡赭色，中室暗黄色，1 脉前后各一褐纵纹，后缘中部附近另一褐斜纹，翅脉微白，两侧衬暗棕色，外线仅现一些黑点，顶角有一内斜淡纹，其外侧色暗，并在各脉间有一暗褐纹；后翅褐色；腹部褐色。

分布 西藏；印度，锡金。

离粘夜蛾 *Leucania distincta* Moore (图版 XX-34)

Aletia distincta Moore, 1881, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 333, pl. 37, fig. 4. (大吉岭)

Aletia exanthemata Moore, 1888, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 410.

Chabuata distincta: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 263.

Hyphilare distincta: Warren, 1913, in Seitz. Macrolep. World 11: 89.

Sideridis distincta: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 303. —Chen, 1992, in Peng. Icon. For. Ins. Hunan p.964.

Leucania distincta: Chen, 1993, in Huang, Anim. Longqi Mt. p. 515.

翅展 32 mm 左右。头部及胸部黄色杂红褐色，颈板近端部有一黑横线，基部有细黑点，翅基片端部及后胸有零星黑点；前翅黄色杂红褐色并散布黑色细点，肾纹外黑点致密，前缘脉较黑灰，内线黑色波浪形，环纹及肾纹黄色，中央各有赤褐色，外线黑色，外侧各翅脉上有一黑点，亚端线黑色，自顶角后内斜，中段稍外弯，后段不显，端线为一列黑色点，缘毛暗褐色；后翅淡黄色，带有污褐色；腹部赭黄色。

分布 湖南、福建、西藏；锡金，印度。

瘠粘夜蛾 *Leucania pallidior* (Draudt) (图版 XX-35)

Cirphis pallidior Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 48, pl. 3, fig. 22. (云南丽江)

Leucania pallidior: Chen, 1982, Icon. Het. sin. 3: 310, pl. 92, fig. 2214.

翅展 28—30 mm。头部及胸部黄白色杂黑灰色；前翅淡赭色，翅脉白色，衬以暗灰色，各翅脉间有暗灰纵纹，内线仅前缘脉及亚中褶处各一黑点，中室下角有一黑点，外线仅前缘脉及 2 脉中部各一黑点，顶角有一内斜纹，其外后侧为一三角形暗灰区；后翅污褐色；腹部暗褐色。

分布 湖南、云南。