

50. 肾纹后部一黑斑 双贯粘夜蛾 *L. binigrata*
 肾纹后部无黑斑 晦粘夜蛾 *L. obscura*

隐粘夜蛾 *Leucania cryptargyria* Bethune-Baker (图版 XX-30)

Leucania cryptargyria Bethune-Baker, 1905, Ann. Mag. nat. Hist. 7 (15): 197. (巴布亚新几内亚)

Cirphis cryptargyria: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 499.

Leucania cryptargyria: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 95.

翅展 36 mm。头、胸、腹及前翅浅赭黄色，颈板有三条黑纹。前翅带绿褐色，前缘区带乳白色，内线只现几个黑点，肾纹为一窄条，外线黑色锯齿形，齿尖为点状，线后半内斜，齿尖处有内斜纹，翅外缘一列黑点；后翅黄白色，外半大部深褐色。前翅反面除基部、前缘区及端区外，均银亮闪光；后翅反面除基部与后缘区外亦银亮闪光。

分布 海南；巴布亚新几内亚。

灰黄粘夜蛾 *Leucania ossicolor* (Warren) (图版 XX-31)

Hyphilare ossicolor Warren, 1912, Nov. Zool. 19: 12. (大吉岭)

Hyphilare ossicolor: Warren, 1913, in Seit, Macrolep. World 11: 92, pl. 12b.

翅展 41 mm。头部与胸部浅灰黄色，下唇须第二节外侧杂少许黑褐色，翅基片有零星黑点；前翅浅灰黄色，散布黑色细点，内线由翅脉上的黑点组成，自前缘脉外斜达亚中褶，其后内弯，外线微黑，锯齿形，齿尖在翅脉上为黑点，肾纹不明显，后部一黑点，外侧带灰色，中脉端部白色，一暗褐纹自顶角内斜至亚端区的中褶处，翅外缘有一列黑点；后翅暗灰色，前缘区黄白色，横脉纹黑褐色，翅脉纹黑灰色，腹部灰黄色。

分布 云南；印度。

白钩粘夜蛾 *Leucania proxima* Leech (图版 XX-32)

Leucania proxima Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 124. (中国西部: Ni-tou)

Cirphis proxima: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 504.

翅展 29 mm。头、胸褐色杂灰色，颈板有三条黑线，翅基片边缘黑棕色；前翅褐赭色，亚中褶基部一黑纵纹，其上有一白点，中脉端为一白纹，在横脉处向前钩，后缘区中部一黑纹，外线黑色锯齿形，在亚中褶处有一内伸黑纹，亚端线浅褐色，外侧暗褐，内侧有一列黑纹；后翅浅褐色，端区色暗；腹部褐色。

分布 河北、河南、四川、云南、西藏。

重粘夜蛾 *Leucania duplicata* Butler (图版 XX-33)

Leucania duplicata Butler, 1889, Ill. Het. Colln Br. Mus. 7: 8. (大吉岭)

Leucania prominens Moore, 1881, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 339.

Hyphilare duplicata var. *limbopunctata* Strand, 1920, Arch. Nat. 84A (12): 105.

Cirphis duplicata: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 506.

Hyphilare duplicata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 91.

Leucania duplicata: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 307. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.195. —Chen, 1992, in Peng. Icon. For. Ins. Hunan p.966.

翅展 31 mm 左右。头部及胸部黄白色，下唇须外侧及额两侧褐色，颈板有三条褐色横线；前翅淡赭色，中室暗黄色，1 脉前后各一褐纵纹，后缘中部附近另一褐斜纹，翅脉微白，两侧衬暗棕色，外线仅现一些黑点，顶角有一内斜淡纹，其外侧色暗，并在各脉间有一暗褐纹；后翅褐色；腹部褐色。

分布 西藏；印度，锡金。

离粘夜蛾 *Leucania distincta* Moore (图版 XX-34)

Aletia distincta Moore, 1881, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 333, pl. 37, fig. 4. (大吉岭)

Aletia exanthemata Moore, 1888, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 410.

Chabuata distincta: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 263.

Hyphilare distincta: Warren, 1913, in Seitz. Macrolep. World 11: 89.

Sideridis distincta: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 303. —Chen, 1992, in Peng. Icon. For. Ins. Hunan p.964.

Leucania distincta: Chen, 1993, in Huang, Anim. Longqi Mt. p. 515.

翅展 32 mm 左右。头部及胸部黄色杂红褐色，颈板近端部有一黑横线，基部有细黑点，翅基片端部及后胸有零星黑点；前翅黄色杂红褐色并散布黑色细点，肾纹外黑点致密，前缘脉较黑灰，内线黑色波浪形，环纹及肾纹黄色，中央各有赤褐色，外线黑色，外侧各翅脉上有一黑点，亚端线黑色，自顶角后内斜，中段稍外弯，后段不显，端线为一列黑色点，缘毛暗褐色；后翅淡黄色，带有污褐色；腹部赭黄色。

分布 湖南、福建、西藏；锡金，印度。

瘠粘夜蛾 *Leucania pallidior* (Draudt) (图版 XX-35)

Cirphis pallidior Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 48, pl. 3, fig. 22. (云南丽江)

Leucania pallidior: Chen, 1982, Icon. Het. sin. 3: 310, pl. 92, fig. 2214.

翅展 28—30 mm。头部及胸部黄白色杂黑灰色；前翅淡赭色，翅脉白色，衬以暗灰色，各翅脉间有暗灰纵纹，内线仅前缘脉及亚中褶处各一黑点，中室下角有一黑点，外线仅前缘脉及 2 脉中部各一黑点，顶角有一内斜纹，其外后侧为一三角形暗灰区；后翅污褐色；腹部暗褐色。

分布 湖南、云南。