



图 380 白点粘夜蛾 *Leucania loreyi* (Duponchel) ♂ 外生殖器

胞粘夜蛾 *Leucania fraterna* (Moore) (图版XX-39)

Aletia fraterna Moore, 1888, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 410. (印度坎格拉)

Chabuata fraterna: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 268.

Sideridis fraterna: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 92, pl. 12c.

Sideridis fraterna: Chen, 1982, Icon. Het. sin. 3: 303. ——Chen et al., 1991, Noct. Fn. Xizang p. 190.

翅展 40 mm 左右。头部及胸部紫红棕色；前翅紫红棕色，散布黑色细点并有许多横裂纹，翅脉微白；后翅淡紫褐色；腹部紫褐色。

分布 西藏；印度。

禽粘夜蛾 *Leucania tangula* Felder et Rogenhofer (图版XXI-1)

Leucania tangula Felder et Rogenhofer, 1874, Reis. Nov. pl. 109, fig. 12. (斯里兰卡)

Leucania mediofusca Hampson, 1891, Het. Colln Br. Mus. 8: 68.

Cirphis tangala: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 510, text fig. 158.

Sideridis tangala: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 93, pl. 12f.

Leucania tangula: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 308, pl. 92, fig. 2196.

翅展 27 mm 左右。头部及胸部赭黄色带褐色；前翅赭黄色中脉前后及 1 脉前后红褐色，中脉白色，3、4 脉白色，其余翅脉色较淡，均衬以褐色，端区各脉间另有褐纹，外线仅 2、3、5、6 脉上现黑点；后翅淡赭色；腹部褐色。

分布 福建、云南；印度，斯里兰卡。