

灰褐色，横脉纹及外线仅在反面明显呈褐色；腹部灰色。

分布 云南、西藏。

点线粘夜蛾 *Leucania lineatissima* (Warren) (图版XXI-32)

Sideridis lineatissima Warren, 1912, Nov. Zool. 19: 12. (印度)

Sideridis lineatissima: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 97, pl. 13b.

Leucania lineatissima: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 310, pl. 92, fig. 2215.

翅展 38 mm 左右。头部及胸部淡黄色杂少许黑色；前翅淡黄色，翅脉白色衬褐色，各翅脉间有暗褐色纵纹，中脉外半一白纹，端部向前微成钩形，其内侧有一黑点，外侧衬以黑灰色，外线为一列黑点，外缘近顶角有一三角形黑灰色斑，端线为一列黑点，缘毛间以暗褐色；后翅暗褐色，外缘有几个黑点，缘毛淡黄色；腹部浅赭黄带灰色。

分布 湖南、四川；锡金，印度。

另有一 *Leucania lineatissima* Joannis 分布越南，非同种。原置 *Borolia* 属，Poole (1989) 将其置 *Leucania* 属。

间粘夜蛾 *Leucania mesotrosta* Püngeler (图版XXI-33)

Leucania mesotrosta Püngeler, [1900] 1899, Iris, 12: 295, pl. 9, fig. 9. (青海湖)

Cirphis mesotrosta: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 547. ——Draudt, 1950, Mitt. munch. ont. Ges. 40: 53.

Sideridis mesotrosta: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 99. ——Draudt, 1934, ibid. Suppl. p. 120. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 304.

翅展 34 mm。头部与胸部灰褐色，微带赤褐色；前翅灰褐色，微带红色并布有黑色细点，翅脉上黑细点较密，内线隐约可见暗褐色，波浪形，中室下角有一明显白点，其内外侧色暗褐，外线暗褐色，锯齿形，在翅脉上为细纹，在前缘脉上为一黑点，在中褶处内凸，4 脉后内弯，翅外缘有一列黑点；后翅污褐色，缘毛赭白色，中有一暗褐线；腹部褐灰色。

分布 陕西、甘肃、青海、四川。

玉粘夜蛾 *Leucania yu* Guenée (图版XXI-34)

Leucania yu Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 1: 78. (马尼拉)

Leucania yu: Calora, 1966, Philipp. Agric. 50: 657, figs. 3, 34, 64. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 309.

翅展 29—31mm。头、胸浅褐黄色；前翅赭白，中室后缘及横脉外侧衬褐色，内线褐色，环纹为一黑点，中室下角一黑点，外线褐色锯齿形，在翅脉上为黑点，顶角有一褐纹，外缘一列黑点；后翅浅褐黄色，向外渐暗，缘毛黄白；腹部浅褐色。雄蛾抱器腹