

延伸成一突，抱钩短小（图 392）。




图 392 玉粘夜蛾 *Leucania yu* Guenée ♂ 外生殖器

寄生：雀稗、甘蔗属。

分布 广东；印度，缅甸，斯里兰卡，新加坡，菲律宾等。

赭点粘夜蛾 *Leucania semiusta* Hampson (图版 XXI-35)

Leucania semiusta Hampson, 1891, Ill. Het. Br. Mus. 8: 69, pl. 144, fig. 17. (印度)

Cirphis semiusta; Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 551.

Sideridis semiusta; Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 98, pl. 13d.

翅展 38 mm。头部与胸部赭黄色带有紫褐色，颈板基半部布有黑褐细点；前翅赭黄色，布有黑褐细点，中室及其后方带有紫褐色，并延伸达端区，内线不显，仅在中室现一暗褐曲纹，肾纹仅现一椭圆形赭色点，外线只现一列黑褐点，自 4 脉后内斜，顶角后有一近三角形斜纹；后翅黄白色，端半部带黑褐色；腹部赭黄色，背面带黑褐色。

分布 云南；印度。

温粘夜蛾 *Leucania modesta* Moore (图版 XXI-36)

Leucania modesta Moore, 1881, Proc. zool. Soc. Lond. p. 335. pl. 37, fig. 11. (大吉岭)

Cirphis modesta; Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 551, pl. 93, fig. 31.

Sideridis modesta; Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 11: 98. pl. 13d.

Leucania modesta; Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 308, pl. 92, fig. 2200.

翅展 37 mm 左右。头部及胸部淡黄色微带褐色，额两侧及下唇须第二节外侧有暗褐斑纹；前翅淡黄色布有黑色细点，内线褐色锯齿形，在各翅脉上为暗褐点，中室下角

有一黑点，其外方有一暗褐斑，外线黑褐色锯齿形，在各翅脉上为黑点，亚端线隐约可见双曲，微呈褐色，前后端不显，外缘一列黑点；后翅淡黄色，端区带暗褐色，外缘一列黑点；腹部浅褐黄色，有黑点。

分布 浙江；印度。

黑线粘夜蛾 *Leucania ferrilinea* Leech (图版 XXI-37)

Leucania ferrilinea Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 128. (中国西部: Pu-tsu-fong, 四川峨眉山, Moupin)

Borolia ferrilinea: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 573, pl. 95, fig. 10.

Sideridis ferrilinea: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 100.

翅展 34—36 mm。头部与胸部灰褐色有绿色感，下唇须外侧黑色，额微黑，足外侧黑褐色；前翅灰褐色，布有褐细点，微带绿色，基线不显，内线黑褐色，锯齿形，中室前不显，环纹与肾纹色浅，在中室下角有一黄白纹，一黑褐纵纹沿中室后缘外伸至亚端区，与自顶角内斜的一黑褐纹相合，外线由双列黑点组成，锯齿形，翅外缘有一列黑点；后翅黑褐色；腹部灰褐色。

分布 四川。

赭粘夜蛾 *Leucania rubrisecta* (Hampson) (图版 XXI-38)

Cirphis rubrisecta Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 553, pl. 94, fig. 15. (不丹)

Sideridis rubrisecta: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World, 11: 98.

Leucania rubrisecta: Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.197.

翅展 39 mm。头部褐赭色，额两侧有黑斑，下唇须外侧带有褐色并有黑点；胸部背面褐赭色，颈板与翅基片有黑点；前翅黄赭色，布有黑色细点，中室及其后方带有紫褐色，中脉暗褐色，中室下角有一黑点，外线只现两列黑点，自4脉后内斜，顶角有一黑纹内斜至5脉中部，其外侧褐色，翅外缘有一列黑点，缘毛褐色；后翅暗褐色，前缘区黄色，翅脉纹微黑，缘毛黄色；腹部暗灰褐色。

分布 西藏；不丹。

庸粘夜蛾 *Leucania mesotrostina* (Draudt) (图版 XXI-39)

Cirphis mesotrostina Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 52, pl. 4, fig. 4. (陕西太白山)

翅展 32 mm。头部与胸部褐色；前翅红褐色，布有零星黑点，各横线不明显，全翅似有无数细波纹，翅内半的波纹外斜肾纹浅赭黄色，中有暗褐纹，外线隐约可见，黑褐色，外弯，后半内斜，翅外缘有一列黑点；后翅暗褐色，可见黑褐色横脉纹，缘毛色