

晦粘夜蛾 *Leucania obscura* (Moore) (图版XX-36)

Aletia obscura Moore, 1882, Lep. Atk. p. 97. (大吉岭)

Aletia rufis Moore, 1888, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 411.

Leucania nepos Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 124.

Chabuata obscura: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 264.

Hyphilare obscura: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 89.

Sideridis obscura: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 303.

翅展 38—44 mm。头部与胸部灰色杂红棕色，布有褐色细点；前翅红棕色，布有褐色细纹及黑色细点，中脉纹黄白色，中室下角有一白点，外侧带黑灰色并较向外扩展，外侧由一列黑点组成，位于各翅脉上，列成外曲弧形，亚端线不明显，外侧色较暗，中段外弯，翅外缘有一列黑点；后翅褐色，前缘区色较浅，端区色暗，缘毛赭白色，中有一褐线；腹部棕褐色，雄蛾腹面有黑色毛簇。

分布 四川、云南；印度。

双贯粘夜蛾 *Leucania binigrata* (Warren) (图版XX-37)

Hyphilare binigrata Warren, 1912, Nov. zool. 19: 12. (印度 Khasia 山)

Hyphilare binigrata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 89, pl. 11g.

翅展 30 mm。头部、胸部及前翅灰黄色，各横线不明显，内线与外线由双列黑点组成，肾纹微白，后半有一黑点，中室下角外有一模糊黑斑，翅外缘有一列黑点；后翅黑褐色，基部灰黄色，翅脉黑褐色，横脉纹只现一黑点，雄蛾翅反面有银色光泽；腹部褐色，基部灰黄色。

分布 云南；印度。

白点粘夜蛾 *Leucania loreyi* (Duponchel) (图版XX-38)

Noctua loreyi Duponchel, 1827, Lep. Fr. 7: 81, pl. 105, fig. 7. (法国)

Leucania loreyi: Leech, 1900, Translent. Soc. Lond. p. 126. —Calora, 1966, Philipp.

Agric., 50: 665, figs. 7, 38, 68. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 307.

翅展 31 mm。头、胸、前翅褐赭色，颈板有二黑线，前翅翅脉微白，前后衬褐色，翅脉间褐色，亚中褶基部一黑纹，中室下角一白点，顶角一内斜纹，外线为一列黑点；后翅白色；腹部白色微褐。雄蛾抱器延伸为一长棘（图 380）。

寄主 稻。

分布 华中、华东、华南；日本，印度，缅甸，菲律宾，印度尼西亚，大洋洲，欧洲。