

合粘夜蛾 *Leucania obsoleta* (Hübner) (图版 XXI-21)

Noctua obsoleta Hübner, [1803], Samml. Eur. Schmett., Noct. pl. 48, fig. 233. (欧洲)

Leucania obsoleta: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 599. —Forster et Wohlfahrt, 1971, Schmett. Mitteleur. p. 103.

翅展 38—40 mm。头、胸及前翅赭黄布有黑褐细点，翅脉纹黄白衬黑褐色，中室及端区各脉间有黑褐纵纹，中室下角一白点，外线为黑点列；后翅白色，翅脉及端区带褐色；腹部褐白色。雄蛾抱钩棘形，背突长，冠稍窄（图 388）。




图 388 合粘夜蛾 *Leucania obsoleta* (Hübner) ♂ 外生殖器

寄主 芦苇。

分布 青海；中亚地区，欧洲。

曲粘夜蛾 *Leucania sinuosa* Moore (图版 XXI-22)

Leucania sinuosa Moore, 1882, Lep. Atk. p. 102. (大吉岭)

Cirphis sinuosa: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 535. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 51.

Leucania sinuosa: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 308, pl. 92, fig. 2201.

翅展 33 mm。头、胸及前翅浅赭黄色，前翅前缘色黑，中室后及 1 脉基部带褐色，肾纹外侧褐及黑色与自外缘内斜的黑褐条相合，中脉白色衬黑色，内线为一列黑点，环纹小，略扁，褐色，肾纹褐色，外线黑色锯齿形，在翅脉为黑点；后翅暗褐色；腹部褐色。

分布 浙江、福建、四川；锡金，印度。