

浅；腹部褐灰色。

分布 陕西、云南。

雾粘夜蛾 *Leucania perirrorata* (Warren) (图版 XXI-40)

Sideridis perirrorata Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 97, pl. 13c. (印度: Khasia 山)

翅展 36 mm。头部与胸部赭黄色；前翅灰黄带褐色，布有黑色细点及细纹，各横线不明显，内线由一系列黑点组成，肾纹模糊，后部暗褐色，外线由双列黑点组成，后半内斜，亚端线暗褐色，间断，在中褶处较显，翅外缘有一列黑点；后翅黑褐色，基部及前缘区内半色浅；腹部赭黄色带褐色。

分布 云南；印度。

研夜蛾属 *Aletia* Hübner

Aletia Hübner, [1821] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 239.

Type-species: *Noctua vitellina* Hübner.

Hyphilare, Hübner, [1821], 1816, Verz. bek. Schmett. p. 239.

Heliophila Hübner, 1822, Syst. Alph. Verz. p. 20, 32.

Leucania Boisduval, 1829, Ind. Meth. p. 82.

Sablia Sukhareva, 1973, Ent. Rev. 52: 413.

Apoma Berio, 1980, Ann. Mus. Civ. Stor. Natur. Giac. Doria. 83: 8, 17.

喙发达，下唇须短，斜向上伸，第三节小，额光滑无突起，复眼大，圆形；胸部被毛和鳞片，前胸背面有毛簇；前翅有一副室，翅反面或有银鳞。雄性外生殖器的冠极发达，与抱器瓣体有明显分界，抱器瓣腹缘中部膨大，冠刺布满全冠。

种 检 索 表

1. 腹有毛簇	2
腹无毛簇	12
2. 翅有银鳞	3
翅无银鳞	9
3. 前翅中脉有白纹	4
前翅中脉无白纹	5
4. 前翅中室有绿褐影，亚中褶有黑褐纹	祝研夜蛾 <i>Aletia pryeri</i>
前翅中室无绿褐影	27
5. 前翅中室及其后黑色	6