

分布 新疆；中亚地区。

淡脉粘夜蛾 *Leucania roseilinea* Walker (图版XXI-14)

Leucania roseilinea Walker, 1862, J. Linn. Soc. zool. 6: 179. (沙捞越)

Leucania roseilinea: Calora, 1966, Philipp. Agric. 50: 651, figs. 1, 32, 62. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China Lep. Noct. 4: 96.

翅展 30 mm。头、胸浅灰褐杂少许褐色；前翅浅赭黄色，有微紫色调，前缘区有细黑点，翅脉纹浅黄色，前后均衬黑褐色，各脉间亦有黑褐纵纹，亚中褶基部一黑纵纹，后缘区内半有一黑褐斜纹，中脉后一黑褐纹，中室下角一黑点，外线为一列黑点；后翅浅赭黄色，外缘一列黑点；腹部赭黄色。雄蛾冠长约为抱器瓣之 $1/3$ ，阴茎粗长(图 383)。




图 383 淡脉粘夜蛾 *Leucania roseilinea* Walker ♂ 外生殖器

寄主 稻。

分布 江苏、江西、福建、广东、海南；印度，斯里兰卡，新加坡，马来西亚。

同纹粘夜蛾 *Leucania simillima* Walker (图版XXI-15)

Leucania simillima Walker, 1862, J. Proc. Linn. Soc. Zool. 6: 179. (加里曼丹)

Leucania simillima: Calora, 1966, Philipp. Agric. 50: 663, figs. 6, 37, 67.

翅展 30 mm。头、胸灰色杂浅褐并带浅紫红色；前翅赭白，翅脉纹色浅，衬有褐色，翅脉间另有褐纹，亚中褶基部一黑纹，1 脉内半后方一黑斜纹，中室后有暗褐影，中室下角一黑点，外线为一列黑点，顶角一黄白斜纹，两侧暗褐，翅外缘有一列黑点；后翅赭白；腹部褐赭色。雄蛾抱器瓣宽大，冠萎缩成鞭形，抱钩短，折曲，背突指形




图 382 粘夜蛾 *Leucania comma* (Linnaeus) ♂ 外生殖器

双纹粘夜蛾 *Leucania bifasciata* Moore (图版 XXI-12)

Leucania bifasciata Moore, 1888, Proc. zool. Soc. Lond. p. 410. (印度)

Cirphis bifasciata: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 523.

Sideridis bifasciata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 95, pl. 12i.

Leucania bifasciata: Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.197.

翅展 35 mm。头部白色杂有少许褐色，下唇须黄褐色；胸部背面灰白色，颈板有二浅灰褐色线，下胸与足带有红色；前翅灰黄色，前、后缘区色较浅，中室有一棕色细线，中室下角有一小黑点，中室横脉内半部黄白色，中室外方的翅脉微白，外线由一系列黑点组成，顶角后有一内斜近三角形暗褐纹，缘毛棕红色；后翅灰白色，近外缘色较暗褐；腹部灰褐色，腹面带有红色。

分布 西藏（樟木）；印度。

垂粘夜蛾 *Leucania propensa* (Püngeler) (图版 XXI-13)

Cirphis (*Leucania*) *propensa* Püngeler, 1906, D. ent. Z., Iris 19: 91, pl. 7, fig. 9. (伊犁地区)

Sideridis propensa: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 98. —Draudt, 1934, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 120, pl. 15h.

翅展 35 mm。头部与胸部灰色微带褐色；前翅褐灰色，前缘区及亚中褶后方布有少许黑色细点—翅脉纹浅灰色，各翅脉衬褐色，翅脉间有褐纵纹，亚中褶有一黑色纵纹自基部达内区，一灰黄纹自顶角内斜达 3 脉中部；后翅灰白色，翅脉纹暗灰色，端区微带褐灰色，缘毛白色；腹部灰色，臀毛簇带褐色。