

50. 肾纹后部一黑斑 双贯粘夜蛾 *L. binigrata*
 肾纹后部无黑斑 晦粘夜蛾 *L. obscura*

隐粘夜蛾 *Leucania cryptargyria* Bethune-Baker (图版 XX-30)

Leucania cryptargyria Bethune-Baker, 1905, Ann. Mag. nat. Hist. 7 (15): 197. (巴布亚新几内亚)

Cirphis cryptargyria: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 499.

Leucania cryptargyria: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 95.

翅展 36 mm。头、胸、腹及前翅浅赭黄色，颈板有三条黑纹。前翅带绿褐色，前缘区带乳白色，内线只现几个黑点，肾纹为一窄条，外线黑色锯齿形，齿尖为点状，线后半内斜，齿尖处有内斜纹，翅外缘一列黑点；后翅黄白色，外半大部深褐色。前翅反面除基部、前缘区及端区外，均银亮闪光；后翅反面除基部与后缘区外亦银亮闪光。

分布 海南；巴布亚新几内亚。

灰黄粘夜蛾 *Leucania ossicolor* (Warren) (图版 XX-31)

Hyphilare ossicolor Warren, 1912, Nov. Zool. 19: 12. (大吉岭)

Hyphilare ossicolor: Warren, 1913, in Seit, Macrolep. World 11: 92, pl. 12b.

翅展 41 mm。头部与胸部浅灰黄色，下唇须第二节外侧杂少许黑褐色，翅基片有零星黑点；前翅浅灰黄色，散布黑色细点，内线由翅脉上的黑点组成，自前缘脉外斜达亚中褶，其后内弯，外线微黑，锯齿形，齿尖在翅脉上为黑点，肾纹不明显，后部一黑点，外侧带灰色，中脉端部白色，一暗褐纹自顶角内斜至亚端区的中褶处，翅外缘有一列黑点；后翅暗灰色，前缘区黄白色，横脉纹黑褐色，翅脉纹黑灰色，腹部灰黄色。

分布 云南；印度。

白钩粘夜蛾 *Leucania proxima* Leech (图版 XX-32)

Leucania proxima Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 124. (中国西部: Ni-tou)

Cirphis proxima: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 504.

翅展 29 mm。头、胸褐色杂灰色，颈板有三条黑线，翅基片边缘黑棕色；前翅褐赭色，亚中褶基部一黑纵纹，其上有一白点，中脉端为一白纹，在横脉处向前钩，后缘区中部一黑纹，外线黑色锯齿形，在亚中褶处有一内伸黑纹，亚端线浅褐色，外侧暗褐，内侧有一列黑纹；后翅浅褐色，端区色暗；腹部褐色。

分布 河北、河南、四川、云南、西藏。

重粘夜蛾 *Leucania duplicata* Butler (图版 XX-33)

Leucania duplicata Butler, 1889, Ill. Het. Colln Br. Mus. 7: 8. (大吉岭)