

弧线粘夜蛾 *Leucania striatella* (Draudt) (图版 XXI-23)

Cirphis striatella Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 53, pl. 4, fig. 5. (云南德钦, 四川巴塘)

翅展 39 mm。头部与胸部暗褐色, 额杂有白色, 触角基部白色, 颈板中部有细白点, 翅基片后半有黑点; 前翅红褐色, 布有细黑点及暗褐细纹, 前缘脉色浅灰黄, 内线粗, 黑色, 外曲弧形, 内侧衬黄灰色, 肾纹只现一窄黄灰纹, 中脉及中室外方的各翅脉纹浅黄灰色, 外线粗, 黑色, 外曲弧形, 外侧衬浅黄灰色, 翅外缘有一列新月形黑纹, 缘毛基部有一黄色微波浪形线; 后翅褐色, 翅脉纹暗褐色, 缘毛浅黄灰色; 腹部背面暗褐色。

分布 四川、云南。

斜纹粘夜蛾 *Leucania cuneilinea* Draudt (图版 XXI-24)

Leucania cuneilinea Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 56, pl. 4, fig. 8. (云南丽江)

翅展 30 mm。头部与胸部灰黄色, 下胸前部带有黑褐色; 前翅灰黄色, 前缘脉灰褐色, 各横线不显, 亚端区有一列黑褐点位于前缘脉与 2 脉间, 列成内斜阵, 中室后缘一褐纵条伸至顶角, 在端区扩展至 5 脉, 翅外缘有一列黑褐点; 后翅褐灰色; 腹部暗褐色。

分布 云南。

分粘夜蛾 *Leucania laniata* Hampson (图版 XXI-25)

Leucania laniata Hampson, 1898, H. Bomb. Nat. Hist. Soc. 11: 444, pl. A, fig. 22. (锡金)

Cirphis laniata Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 496.

Hyphilare laniata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 89, pl. 11g.

翅展 36 mm。头部与胸部白色微带红色并杂有少许褐色, 颈板有 3 条褐线, 翅基片内缘有少许细黑点; 前翅白色微带红色, 布有黑色细点, 中室基部后方有一黑纵纹, 各翅脉前后衬褐色, 端区各翅脉间有褐色纵纹, 中室下角有一黑点, 中脉端部有一白纹, 外线由一系列黑点组成, 外弯至 4 脉后内斜, 顶角后隐约可见一暗褐内斜纹, 亚端线由 1—5 脉上的黑点组成, 翅外缘有一列黑点; 后翅白色, 除前、后缘区及基部外均带褐色, 缘毛白色, 基部褐色; 腹部白色微带红色, 背面带黑褐色, 雄蛾腹基部两侧各有一黑色毛簇。

分布 西藏; 锡金。

雄蛾前、后翅反面均有银鳞。