



图 380 白点粘夜蛾 *Leucania loreyi* (Duponchel) ♂ 外生殖器

### 胞粘夜蛾 *Leucania fraterna* (Moore) (图版XX-39)

*Aletia fraterna* Moore, 1888, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 410. (印度坎格拉)

*Chabuata fraterna*: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 268.

*Sideridis fraterna*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 92, pl. 12c.

*Sideridis fraterna*: Chen, 1982, Icon. Het. sin. 3: 303. ——Chen et al., 1991, Noct. Fn. Xizang p. 190.

翅展 40 mm 左右。头部及胸部紫红棕色；前翅紫红棕色，散布黑色细点并有许多横裂纹，翅脉微白；后翅淡紫褐色；腹部紫褐色。

分布 西藏；印度。

### 禽粘夜蛾 *Leucania tangula* Felder et Rogenhofer (图版XXI-1)

*Leucania tangula* Felder et Rogenhofer, 1874, Reis. Nov. pl. 109, fig. 12. (斯里兰卡)

*Leucania mediofusca* Hampson, 1891, Het. Colln Br. Mus. 8: 68.

*Cirphis tangala*: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 510, text fig. 158.

*Sideridis tangala*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 93, pl. 12f.

*Leucania tangula*: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 308, pl. 92, fig. 2196.

翅展 27 mm 左右。头部及胸部赭黄色带褐色；前翅赭黄色中脉前后及 1 脉前后红褐色，中脉白色，3、4 脉白色，其余翅脉色较淡，均衬以褐色，端区各脉间另有褐纹，外线仅 2、3、5、6 脉上现黑点；后翅淡赭色；腹部褐色。

分布 福建、云南；印度，斯里兰卡。

### 洲粘夜蛾 *Leucania insularis* Butler (图版XXI-2)

*Leucania insularis* Butler, 1880. Proc. zool. Soc. Lond. p. 674. (台湾)

*Axylia albivena* Moore, 1881, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 342.

*Axylia irrorata* Moore, 1881, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 341.

*Cirphis insularis*: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 486, pl. 91, fig. 22. — Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 47.

*Sideridis insularis*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 93, pl. 12d.

*Leucania insularis*: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 307. —Chen, 1992, in Peng. Icon. For. Ins. Hunan p. 965.

翅展 29 mm 左右。头部、胸部及腹部淡赭黄色，下唇须外侧微黑，额两侧有黑斑，颈板有三条黑色横线，翅基片内缘有黑线；前翅赭色，布有褐点，外半部各脉间带褐色，亚中褶内半有一黑纵纹，中脉较白，两侧衬黑色，环纹及肾纹黄白色，肾纹后半有一黑点，外线为一列黑点，排成弧形，端线为一列黑点；后翅白色，端区微带褐色。

分布 湖南、台湾、广东、广西、海南、云南；印度，印度尼西亚。

### 格粘夜蛾 *Leucania tessellum* (Draudt) (图版XXI-3)

*Hyssia tessellum* Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 41, pl. 2, fig. 21. (云南丽江)

*Hermonassa tessellum*: Boursin. 1967, Z. Wien. ent. Ges. 52: 28.

*Hyssia tessellum*: Chen, 1993, Ins. Hengduan Mts. p. 1014.

*Leucania tessellum*: Poole, 1989, Lep. Cat. p. 587.

翅展 35 mm。头部与胸部黄白色，下唇须外侧黑褐色，端部黑色，颈板基部黄色，端部黄白色，中部有黑横纹；前翅黄白色，布有黑色细点，基线粗，黑色，内线黑色，带状，多线黑色，带状，内、外线间在中褶处有一黑纵条相连，环、肾纹间有一黑弧纹，翅后缘有一黑纵条，自内线稍内至外线，顶角有一黑色斜纹伸达外线，缘毛黑色与黄白色相间；后翅黄白色，大部带有黑色；腹部黄白色。

分布 云南。

### 德粘夜蛾 *Leucania dharma* Moore (图版XXI-4)

*Leucania dharma* Moore, 1881, Proc. zool. Soc. Lond. p. 338, pl. 37, fig. 17. (大吉岭)

*Leucania rufescens* Moore, 1882, Lep. Atk. p. 102.

*Cirphis dharma*: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 516, pl. 92, fig. 15. — Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 49.

*Sideridis dharma*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 94.

*Leucania dharma*: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 308. —Chen et al., 1991, Noct. Fn.