

线、纹均不显，肾纹银白色，黑边，前半窄斜，后半肥突，内侧有一粗而微波曲白线，自前缘脉内斜至翅后缘，线两侧衬黑色，外方在5脉之前有一黄斑，肾纹后有一黄条纹，亚端线隐约可见浅黄色，在前缘区为一近楔形纹，在3脉后内弯；后翅黄白色，布有褐色细点，基部稍带红褐色，端线暗褐色；腹部黄色，背面布有褐色细点。

分布 云南。

锈色俚夜蛾 *Lithacodia fentoni* (Butler) (图版XLI-37)

Erastria fentoni Butler, 1881, Trans. ent. Soc. Lond. (日本)

Erastria versicolor Oberthür, 1884, Et. ent. 10: 25.

Jaspidia fentoni: Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. jap. p. 151.

Lithacodia fentoni: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 519, pl. 164, fig. 12. ——Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 3: 278. ——Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 818. ——Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 122.

翅展24 mm。头部与胸部红褐色杂赭黄色，下唇须赭白色杂黑褐色；前翅红褐色布有黄色细点，端区色较红，基线、内线不显，肾纹银白色，黑边，前半窄，似一足形，外侧杂有橙黄色，外线粗，白色，有间断，波浪形，两侧衬黑色，外侧在中褶与亚中褶处有小黄斑，外区前缘脉上有一列白点，亚端线前段白色，其后黄色，有间断，中段稍外弯，缘毛白色，基部有一黑线，端部在顶角、中部及臀角杂有黑色；后翅暗褐色，缘毛白色，近基部有一褐线；腹部褐色杂黄色，背毛簇端部黑色。

分布 黑龙江、湖北；日本，朝鲜，俄罗斯。

黑斑俚夜蛾 *Lithacodia melanostigma* (Hampson) (图版XLI-38)

Erastria melanostigma Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 302. (印度；爪哇)

Lithacodia melanostigma: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 534, pl. 164, fig. 29. ——Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 284. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 330. ——Chen et al., 1991, Noct. Fn. Xizang p. 289.

翅展17 mm左右。头部及胸部淡褐黄色，翅基片末端黑色，下唇须第一、二节外侧大部黑色；前翅淡褐色，端区色较深，基线仅前缘脉及中室各现一黑点，内线前端为二黑点，在中室后为内斜白条，环纹白色，中央黑色，肾纹大，白色，内缘有一黑曲纹，外缘深内凹，环纹与肾纹间有一白条，外线双线黑色，线间白色，内外线间在中室后及肾纹外侧均黑色，亚端线白色，内侧微黑，在7、6脉及4、3脉成外突齿；后翅淡褐色。

分布 云南（金平）；印度，印度尼西亚。

衰俚夜蛾 *Lithacodia senex* (Butler) (图版XLI-39)

Erastria senex Butler, 1881, Trans. ent. Soc. Lond. p. 189. (日本)