

端部膨大，基线仅前端现一白纹，各横线黑色，内线波浪形外斜，剑纹、环纹白色黑边，肾纹白色，中央黑绿色，中线粗，前端为小斑，后半波浪形，外线锯齿形，内侧有一列白纹，亚端线间断为齿形纹，与外线间褐灰色，近顶角一黑斑；后翅褐灰色；腹部白色带褐灰色。

分布 江苏、湖北、湖南。

串纹俚夜蛾 *Lithacodia numisma* (Staudinger) (图版XLI-47)

Erastria numisma Staudinger, 1888, Schmett. ent. Z. 49: 265. (Askold)

Erastria olivacea Leech, 1889, Proc. zool. Soc. p. 526.

Lithacodia numisma: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 546. ——Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 3: 279. ——Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 815. ——Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 121.

翅展 20—26 mm。头、胸及前翅黄白杂绿褐及黑色；前翅基线、内线、中线及外线黑色，基线双线，内线双锯齿形，剑纹白色，中央有一黑点，环纹白色，中央黑色，环纹、剑纹相接于中脉，似“8”字形，肾纹有褐黄环及黑边，内线、外线间在中室后方暗褐绿色，亚端线白色锯齿形，翅外缘一列黑点；后翅褐色；腹部黑褐杂黄白色。

分布 黑龙江、吉林；日本，朝鲜，俄罗斯。

虚俚夜蛾 *Lithacodia falsa* (Butler) (图版XLI-48)

Miana falsa Butler, 1885, Cist. Ent. 3: 132. (日本)

Erastria falsa: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 142.

Lithacodia falsa: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 541. ——Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 3: 278. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 331. ——Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 818.

翅展 20 mm。头、胸黑褐杂灰白色；前翅黑色有细白点，基部带灰褐色，外区、端区后半微白，基线不明显，黑色，自前缘脉至亚中褶，内线黑色，波浪形，不明显，内侧衬以白色，环纹圆形，灰色，中有暗褐点，中线黑色，模糊，自前缘脉外斜至中室，在中室下角折向内斜，微内曲，肾纹约呈“8”字形，灰色，上、下各一黑点，外线双线黑色波浪形，线间白色，亚端线灰白色，翅外缘一列黑点；后翅褐色；腹部浅灰褐色。

分布 江苏、江西、四川；日本。

白臀俚夜蛾 *Lithacodia pygarga* (Hufnagel) (图版XLI-49)

Phalaena pygarga Hufnagel, 1766, Berl. Mag. 3 (4): 408. (德国)

Lithacodia pygarga: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 330.