

端部膨大，基线仅前端现一白纹，各横线黑色，内线波浪形外斜，剑纹、环纹白色黑边，肾纹白色，中央黑绿色，中线粗，前端为小斑，后半波浪形，外线锯齿形，内侧有一列白纹，亚端线间断为齿形纹，与外线间褐灰色，近顶角一黑斑；后翅褐灰色；腹部白色带褐灰色。

**分布** 江苏、湖北、湖南。

### 串纹俚夜蛾 *Lithacodia numisma* (Staudinger) (图版 XLI-47)

*Erastria numisma* Staudinger, 1888, Schmett. ent. Z. 49: 265. (Askold)

*Erastria olivacea* Leech, 1889, Proc. zool. Soc. p. 526.

*Lithacodia numisma*: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 546. ——Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 3: 279. ——Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 815. ——Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 121.

翅展 20—26 mm。头、胸及前翅黄白杂绿褐及黑色；前翅基线、内线、中线及外线黑色，基线双线，内线双锯齿形，剑纹白色，中央有一黑点，环纹白色，中央黑色，环纹、剑纹相接于中脉，似“8”字形，肾纹有褐黄环及黑边，内线、外线间在中室后方暗褐绿色，亚端线白色锯齿形，翅外缘一列黑点；后翅褐色；腹部黑褐杂黄白色。

**分布** 黑龙江、吉林；日本，朝鲜，俄罗斯。

### 虚俚夜蛾 *Lithacodia falsa* (Butler) (图版 XLI-48)

*Miana falsa* Butler, 1885, Cist. Ent. 3: 132. (日本)

*Erastria falsa*: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 142.

*Lithacodia falsa*: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 541. ——Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 3: 278. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 331. ——Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 818.

翅展 20 mm。头、胸黑褐杂灰白色；前翅黑色有细白点，基部带灰褐色，外区、端区后半微白，基线不明显，黑色，自前缘脉至亚中褶，内线黑色，波浪形，不明显，内侧衬以白色，环纹圆形，灰色，中有暗褐点，中线黑色，模糊，自前缘脉外斜至中室，在中室下角折向内斜，微内曲，肾纹约呈“8”字形，灰色，上、下各一黑点，外线双线黑色波浪形，线间白色，亚端线灰白色，翅外缘一列黑点；后翅褐色；腹部浅灰褐色。

**分布** 江苏、江西、四川；日本。

### 白臀俚夜蛾 *Lithacodia pygarga* (Hufnagel) (图版 XLI-49)

*Phalaena pygarga* Hufnagel, 1766, Berl. Mag. 3 (4): 408. (德国)

*Lithacodia pygarga*: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 330.

翅展 21 mm。头、胸及前翅褐黑色，翅基片有灰白斑。前翅基线、内线、中线及外线黑色波浪形，内线、外线均双线，双线间灰白色，环纹、肾纹灰白色黑边，两纹间带黑色，肾纹外侧有黑点，亚端线白色，在 2—5 脉间波浪形外弯，前端内侧有黑纹，其后带有霉绿色，翅外缘一系列黑点；后翅浅褐色；腹部暗褐色，节间灰色。

**分布** 黑龙江；日本，朝鲜，欧洲。

### 阴俚夜蛾 *Lithacodia stygia* (Butler) (图版 XLI-50)

*Erastria stygia* Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5; 1: 199. (日本)

*Lithacodia stygia*: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 540. —Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 3: 278. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 331. —Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 817.

翅展 24 mm。头、胸黑色杂少许白色及褐色；前翅黑棕色杂少许红、白细点，基线、内线、中线及外线均黑色，除中线外均波浪形，剑纹、环纹浅褐色黑边，肾纹小，内、外缘中凹，褐灰色，约呈“8”字形，外线后段外侧灰色，亚端线灰白色，中段外弯，翅外缘一系列黑点，内侧衬白色；后翅褐色；腹部暗灰褐色。

**寄主** 稻、竹等。

**分布** 浙江、湖北、福建、四川；日本，朝鲜。

### 污俚夜蛾 *Lithacodia squalida* (Leech) (图版 XLI-51)

*Erastria squalida* Leech, 1889, Proc. zool. Soc. Lond. p. 527, pl. 52, fig. 9. (日本)

*Lithacodia squalida*: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 550. —Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 3: 279, pl. 52e. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 818, pl. 355, fig. 22. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.999.

翅展 30 mm。头部浅褐色杂有暗褐鳞；胸部浅褐色，颈板杂有深褐色，足暗褐色，跗节各节间有淡褐环；前翅浅灰褐色，亚端线内方的前缘区暗褐色，基线仅在前缘区现一浅褐灰色纹，内线不明显，内侧衬灰白色，在中室后缘折角内斜，在 1 脉后稍外凸，环纹不清晰，其外下角有一灰白纹斜向肾纹后，中线仅后半可见，黑色，自中室下角内弯至翅后缘，肾纹有不完整的黑边，中部凹，环纹与肾纹之间的中室带有黑色，外线双线黑色，线间灰白色，自前缘脉外弯并呈波曲形，4 脉后内弯，在 1 脉处稍外凸，外区前缘脉上有一列灰白点，亚端线隐约可见灰白色，波浪形，内侧有一列黑纹，翅外缘有一列新月形黑点；后翅浅褐色，缘毛灰白色，基部有一褐线；腹部浅褐色，毛簇端部灰黑色。

**分布** 山东、江苏、浙江、湖南、福建。