

戴夜蛾属 *Lopharthrum* Hampson

Lopharthrum Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 18.

Type-species: *Amphigonia comprimens* Walker.

喙发达，下唇须向上伸并弯向后，第二节达头顶，第二、三节有致密的毛簇，雄蛾触角线形，有纤毛；胸部无毛簇，雄蛾翅基片极长，前足胫节有致密的毛簇；前翅顶角尖外突，外缘中部成外突钝角，缘毛波浪形；后翅外缘似前翅，5脉发达，自中室横脉近中部发出。

戴夜蛾 *Lopharthrum comprimens* (Walker) (图版 LXIV-29)

Amphigonia comprimens Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1540. (Bengal)

Eriocera cluysenaeri Heylaerts, 1888, Compt. Rend. Sean. Soc. ent. Belg. 32: 661.

Lopharthrum comprimens: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 18, fig. 6. —Chen, 1982,

Icon. Het. Sin. 3: 377. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.1031.

翅展 45 mm。头部紫红棕色，下唇须长，向上伸，超过头顶；胸部背面淡紫褐色，颈板红棕色，有淡赭黄色斑纹，翅基片端部及后胸有赭黄色斑纹，足深褐色，各跗节有白斑，前足胫节杂有棕红色毛；前翅淡红棕色，基线褐色，不明显，细弱而微曲，自前缘脉内斜至亚中褶，内线由一系列不整齐的黑棕色点组成一内斜条，其内侧衬以红棕色及淡黄色，环纹只现一黑点，肾纹长窄，模糊，暗棕色，外线细弱，褐色，不规则波曲，自前缘脉后内斜至翅后缘近中部，后端微外斜，亚端区有一列大小不齐的淡赭黄色斑，在1—6脉间连成一片，在2—5脉间的斑内侧有三个新月形白纹，其外侧及中部则为暗褐色，翅外缘中部外突，缘毛波浪形；后翅淡红棕色，可见褐色横脉纹，外线细，褐色，微波曲，亚端线褐色，外侧有一列淡赭黄色新月形纹，其外有一片淡赭黄色，自5脉至臀角，其中有锯齿形褐线将赭黄色区分割为不规则形小斑，缘毛锯齿形；腹部暗褐色，基部背面有一黄斑。

分布 广东、海南、广西；印度，印度尼西亚。

碑夜蛾属 *Hyposemansis* Hampson

Hyposemansis Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 2.

Type-species: *Mamorinia singha* Guenée.

喙发达，下唇须向上伸，第二节长，第三节细长，远超过头顶，触角线形，足胫节饰毛，中足胫节基部有长毛簇；前翅外缘斜曲，有一副室；后翅5脉发达，外缘波曲。