

Berio, 1950, Ann. Mus. civ. Stor. nat. Giac. Doria 64: 154, fig. 72 male genitalia. —
Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 329.

翅展 19 mm。头、胸暗棕色，前胸有一黑褐纹；前翅棕褐色，基线仅前端现一暗褐纹，内线双线棕色，微曲内斜，中线粗，前后端与外线相遇，肾纹灰棕色，内缘一白纹，外线双线棕色，线间白色，在 4、6 脉处成外突齿，亚端线棕色波浪形，外侧衬灰色，外线与亚端线间的前半棕色，端线黑色，亚中褶处一黑点；后翅暗棕色；腹部棕褐色。

分布 湖北、江西、四川；不丹，缅甸，斯里兰卡，新加坡。

微夜蛾属 *Lophomilia* Warren

Lophomilia Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 411.

Type-species: *Egnasia polybapta* Butler.

本属与 *Pangrapta* 较近似，但腹部前三节上有毛簇；前翅狭长，外缘平整，在 4 脉处不凸出；本属与 *Lophograpta* 也近似，但后翅 3、4 脉不合成一柄；前翅前缘无灰色斑。

种 检 索 表

1. 前翅中区后半黄色 2
前翅中区后半无明显黄色 小冠微夜蛾 *Lophomilia polybapta*
2. 前翅内、外线后半近平行 日微夜蛾 *L. takao*
前翅内线不明显 座黄微夜蛾 *L. flaviplaga*

小冠微夜蛾 *Lophomilia polybapta* (Butler) (图版 XLI-15)

Egnasia polybapta Butler, 1879, Het. Colln Br. Mus. 3: 66, pl. 57, fig. 7. (日本横滨)

Lophomilia polybapta: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 411, pl. 71i. —Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. Jap. p. 183. —Chu *et al.*, 1963, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 1: 142. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 379. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 879. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 1033.

翅展 25 mm。头部与胸部褐色；前翅红赭色，内半部微黄，内线棕色，自前缘脉外斜至中室折角内斜，后半内侧衬黑色，环纹只现一白点，肾纹只现一黑点，外线白色，内侧衬黑色，外侧衬褐色，自前缘脉后二曲形外弯，至 3 脉后内斜，自 2 脉基部波曲向后，亚端线灰白色，与外线之间黑褐色，前半有一列齿形黑斑；后翅灰黄色带褐色；腹部棕褐色。

分布 江苏、云南；日本，朝鲜。