

座黄微夜蛾 *Lophomilia flaviplaga* (Warren) (图版 XLI-16)

Micardia flaviplaga Warren, 1912, Nov. zool. 19: 38. (日本横浜)

Lophomilia flaviplaga: Sugi, 1962, Akitu 10: 38, figs. 1, 6. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 880, pl. 218, fig. 28.

Micardia flaviplaga: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China Lep. Noct. 4: 123.

翅展 21 mm。头部与胸部灰白色杂浅褐色, 额黄褐色, 下唇须赭黄色, 上缘暗褐色; 前翅褐黄色带紫色, 前缘区中段微白, 端区带黑褐, 前缘脉基部后方有一深棕色纵纹, 内线白色, 自亚中褶内斜至后缘, 较粗, 中室外半带有黑褐色, 肾纹为一黑点, 外线白色, 前端粗, 自前缘脉外斜至中褶, 折成圆角内斜, 至 2 脉基部折向后行, 在亚中褶后稍内斜并呈银白色粗条状, 内线、外线之间在亚中褶后呈杏黄色杂有黑色, 中室外方的中褶有一黑纹, 亚端线白色, 不规则波浪形外弯, 在 4 脉后内斜, 前段内侧有黑色锯齿形点, 外侧近顶角有一杏黄色斑, 缘毛黑褐色, 基部一灰白细线; 后翅褐色; 腹部褐黄色。

分布 江西; 日本。

日微夜蛾 *Lophomilia takao* Sugi (图版 XLI-17)

Lophomilia takao Sugi, 1962, Akitu, 10: 37, fig. 2 adult, fig. 5 male genitalia. (日本东京)

Lophomilia takao: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 880, pl. 218, fig. 27.

翅展 22 mm。头部与胸部红褐色杂黄白色; 前翅浅褐色微带紫色, 前缘区基部有一黑褐纵纹, 内线仅后半明显, 强内斜, 外线极细, 自前缘脉强外斜, 至 6 脉折向内弯, 亚中褶后强内斜, 与内线平行, 亚中褶后的内、外线之间白色间红棕色及黄色, 中室外方有一黑褐纵纹, 亚端线细, 白色, 内侧衬黑色, 外弯, 亚中褶后与外线近平行, 顶角有一红棕纹, 内侧衬白色; 后翅暗褐色, 基部浅褐灰色; 腹部褐色。

分布 湖北; 日本。

卫翅夜蛾属 *Amyna* Guenée

Amyna Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 1: 406.

Type-species: *Amyna selenampha* Guenée.

Berresa Walker, [1859] 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 208.

Ilattia Walker, [1859] 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 208.

Amynodes Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 273.

Formosamyna Strand, 1920, Arch. naturg. 84A (12): 119.

喙发达, 下唇须向上伸, 第二节约达头顶, 额光滑无突起, 雄蛾触角线形; 胸部背面无毛簇; 前翅短宽; 后翅 5 脉发达, 自中室下角上方伸出, 臀角较圆。