

Lophoptera aleuca: Gaede, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 374, pl. 34h.

翅展 38mm。头部与胸部暗褐色杂有少许赭黄色，下胸黄白色；前翅灰色带紫褐色，前缘区黑褐色，内线双线黑色，波浪形外斜，中线黑色，自前缘脉外斜至中室后折角内斜，环纹隐约可见黑边，肾纹褐色黑边，外线双线黑色，7脉后明显，锯齿形内斜，4脉后内弯，外区前缘脉上有一列白点，亚端线双线黑色，细锯齿形，翅外缘有一列黑纹；后翅黑褐色，内半部在亚中褶前为透明白色区，缘毛端部白色。

分布 海南；澳大利亚。

凝脊蕊夜蛾 *Lophoptera coangulata* Warren (图版 XLIII-15)

Lophoptera coangulata Warren, 1914, Nov. zool. 21: 416. (印度卡西亚山)

Lophoptera coangulata: Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 375. ——Holloway, 1985, Malay. Nat. J. 38: 259.

翅展 26mm。头部与胸部红棕色杂黑褐色，下唇须杂有灰白色，下胸黄白色，足外侧黑褐色，有黄白斑；前翅黑褐色有紫色感，外线与中线间的前半部明显杂有白色，似一宽“V”形大斑，基线双线黑色，微波浪形，自前缘脉外斜至1脉，线间杂有棕色，后端沿1脉有一白纵纹，内线双线黑色，波浪形，前半部双线间棕色，在中室和亚中褶处各有一黑色竖鳞丛，肾纹白色，中有二黑色波曲纹，内缘有黑色竖鳞丛，前方有一白斑，中线黑色，在中室前为双黑纹，在中室后单线，在1脉处为一外突角，外线双线黑色，亚中褶处有褐色竖鳞丛，亚端线白色锯齿形，1脉前及5—6脉间有黑竖鳞丛；后翅白色半透明，翅脉与端区褐黑色；腹部暗褐色。

分布 广西；印度。

绿纹脊蕊夜蛾 *Lophoptera smaragdipanii* Holloway (图版 XLIII-16)

Lophoptera smaragdipanii Holloway, 1985, Malay, Nat. J. 38: 274, pl. 6: 9. figs. 246, 252. (沙撈越)

翅展 28mm。头部褐色杂有褐黑色，触角基节杂有白色；胸部灰褐色杂黑褐色；前翅褐色，前缘区色较暗，一绿白色宽纵条自翅基部达外区，其前缘基部达前缘脉，前、后缘均不平滑，内线隐约可见褐黑色双线锯齿形，仅在中室后明显，环纹与肾纹仅现一褐黑色曲纹，由竖鳞组成，外线隐约可见黑褐色双线，微锯齿形；后半内斜，亚端线黄白色衬以黑褐色，不明显，翅外缘有一列黑褐点；后翅褐黑色；腹部暗褐色。

分布 海南；马来西亚。

斜脊蕊夜蛾 *Lophoptera illucida* (Walker) (图版 XLIII-17, 18)

Stictoptera illucida Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 918. (印度)