

### 白线脊蕊夜蛾 *Lophoptera hypenistis* (Hampson) (图版 XLIII-20)

*Stictoptera hypenistis* Hampson, 1905, Ann. Mag. nat. Hist. 7, 16: 536. (缅甸)

*Lophoptera hypenistis*: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 193, pl. 179, fig. 10. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 378.

翅展 29mm。头、胸棕色；前翅红棕色，外线外方带黑褐色，内线、中线及外线均双线黑褐色，内线、中线波浪形，肾纹隐约可见细黑边，外线外方有一列锯齿形黑点，亚端线黑褐色锯齿形，前段两侧黑褐色，端线黑色；后翅黑褐色，除端区外各翅脉间色浅并半透明；腹部黑褐色。

分布 四川；缅甸，锡金。

### 歧脊蕊夜蛾 *Lophoptera tripartita* Swinhoe (图版 XLIII-21)

*Gyrtona tripartita* Swinhoe, 1902, Ann. Mag. nat. Hist. 7, 9: 84. (霹雳)

*Lophoptera tripartita*: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 193. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 378. —Holloway, 1985, Malay. Nat. J. 38: 254.

翅展 32mm。头、胸及前翅红棕色，前翅基线、内线及中线暗褐色，前者波浪形，内线外侧一白线，中室及亚中褶各一黑短纹紧贴白线，肾纹灰棕色黄白边，外围有黑点，外线双线暗棕色，亚端线黄白色锯齿形，内方一列黑褐纹组成模糊波浪形线，端区黑褐色，各翅脉端有一白点；后翅黑褐色；腹部暗褐色。

分布 海南；马来西亚。

### 昏脊蕊夜蛾 *Lophoptera negretina* (Hampson) (图版 XLIII-22)

*Stictoptera negretina* Hampson, 1902, J. Bomb. Soc. 14: 212. (印度)

*Lophoptera negretina*: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 189, pl. 179, fig. 2. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 376, pl. 35c. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 125.

翅展 32mm。头、胸暗褐杂灰黑色；前翅灰褐色，布有黑色点，基线为一较粗黑纹，自前缘脉外斜至中室，内线双线黑色波浪形，微外弯，剑纹与环纹均为黑色曲条，由竖鳞组成，中线黑色明显，自前缘脉较直外斜至亚中褶，其后内曲，在 1 脉成一内凸齿，肾纹大，赭黄色，边线黑色不完整，其前方有一黑褐斜纹，外线双线黑色，自前缘脉外斜至 7 脉，其后内弯于 4—6 脉间和 4 脉后，并呈微波浪形，前段外侧有一黑色斜纹与之平行，亚端线黑色锯齿形，端区一隐约锯齿形线，端线黑色间断；后翅黑褐色；腹部黄灰色，有黑褐横纹。

分布 广西；印度。