

Lophoptera aleuca: Gaede, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 374, pl. 34h.

翅展 38mm。头部与胸部暗褐色杂有少许赭黄色，下胸黄白色；前翅灰色带紫褐色，前缘区黑褐色，内线双线黑色，波浪形外斜，中线黑色，自前缘脉外斜至中室后折角内斜，环纹隐约可见黑边，肾纹褐色黑边，外线双线黑色，7脉后明显，锯齿形内斜，4脉后内弯，外区前缘脉上有一列白点，亚端线双线黑色，细锯齿形，翅外缘有一列黑纹；后翅黑褐色，内半部在亚中褶前为透明白色区，缘毛端部白色。

分布 海南；澳大利亚。

凝脊蕊夜蛾 *Lophoptera coangulata* Warren (图版 XLIII-15)

Lophoptera coangulata Warren, 1914, Nov. zool. 21: 416. (印度卡西亚山)

Lophoptera coangulata: Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 375. ——Holloway, 1985, Malay. Nat. J. 38: 259.

翅展 26mm。头部与胸部红棕色杂黑褐色，下唇须杂有灰白色，下胸黄白色，足外侧黑褐色，有黄白斑；前翅黑褐色有紫色感，外线与中线间的前半部明显杂有白色，似一宽“V”形大斑，基线双线黑色，微波浪形，自前缘脉外斜至1脉，线间杂有棕色，后端沿1脉有一白纵纹，内线双线黑色，波浪形，前半部双线间棕色，在中室和亚中褶处各有一黑色竖鳞丛，肾纹白色，中有二黑色波曲纹，内缘有黑色竖鳞丛，前方有一白斑，中线黑色，在中室前为双黑纹，在中室后单线，在1脉处为一外突角，外线双线黑色，亚中褶处有褐色竖鳞丛，亚端线白色锯齿形，1脉前及5—6脉间有黑竖鳞丛；后翅白色半透明，翅脉与端区褐黑色；腹部暗褐色。

分布 广西；印度。

绿纹脊蕊夜蛾 *Lophoptera smaragdipanii* Holloway (图版 XLIII-16)

Lophoptera smaragdipanii Holloway, 1985, Malay, Nat. J. 38: 274, pl. 6: 9. figs. 246, 252. (沙撈越)

翅展 28mm。头部褐色杂有褐黑色，触角基节杂有白色；胸部灰褐色杂黑褐色；前翅褐色，前缘区色较暗，一绿白色宽纵条自翅基部达外区，其前缘基部达前缘脉，前、后缘均不平滑，内线隐约可见褐黑色双线锯齿形，仅在中室后明显，环纹与肾纹仅现一褐黑色曲纹，由竖鳞组成，外线隐约可见黑褐色双线，微锯齿形；后半内斜，亚端线黄白色衬以黑褐色，不明显，翅外缘有一列黑褐点；后翅褐黑色；腹部暗褐色。

分布 海南；马来西亚。

斜脊蕊夜蛾 *Lophoptera illucida* (Walker) (图版 XLIII-17, 18)

Stictoptera illucida Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 918. (印度)

Lophoptera illucida: Hampson, 1912, Cat.

Lep. Phal. Br. Mus. 11: 182. —

Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11:

375. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3:

338. —Holloway, 1985, Moths Borneo,

p. 260.

翅展 28—34mm。头、胸及前翅棕色带灰色，前翅基线、内线及外线均双线黑色，内、外线波浪形，中线黑色，内线后端外侧一丘形黑斑，肾纹浅褐色黑边，中有黑褐纹，亚端线黑色，外侧 2—4 脉间有黑斑，顶角有一黑斑，端线为一列黑点；后翅内半部半透明，翅脉及端半部黑棕色；腹部暗棕色。雄蛾抱器瓣极窄长，背缘 1/3 处有一棘突，囊形突肥大（图 588）。

寄主 岩扇。

分布 海南、四川、西藏；锡金，印度，缅甸，斯里兰卡，大洋洲。

多型种。前翅斑纹有变异。




图 588 斜脊蕊夜蛾 *Lophoptera illucida*
(Walker) ♂ 外生殖器

铅脊蕊夜蛾 *Lophoptera apirtha* (Swinhoe) (图版 XLIII-19)

Stictoptera apirtha Swinhoe, 1900, Cat. Het. Oxf. Univ. Mus. p. 92. (印度)

Gyrtona chalybea Butler, 1883, Proc. zool. Soc. p. 163.

Lophoptera plumbeola Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 184, pl. 178, fig. 27.

Lophoptera apirtha: Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 375, pl. 35b.

Lophoptera plumbeola: Chen et al., 1991, Noct. Fn. Xizang p.298.

翅展 26—32mm。头部与胸部暗紫棕色，下胸浅灰色，足跗节有白环纹；前翅暗红褐色带紫灰色调，基线不明显，双线黑色，自前缘脉外弯至亚中褶，内线双线黑色，波浪形，剑纹与环纹仅外缘现红褐点，均由竖鳞簇组成，肾纹中央红褐色，边缘黑色，由竖鳞组成，中线黑色，在中室及其后外凸，外线双线黑色，自前缘脉后外弯，锯齿形，4 脉后内弯，外区前缘脉上有一列白点，亚端线灰白色外侧衬黑褐色，在 7 脉处稍外凸，端区各翅脉上有褐纹，端线黑色，各翅脉端有白点，缘毛端部杂有白点；后翅黑褐色，中室及其后、外方半透明，缘毛端部白色；腹部褐色带灰色，腹面白色，布有褐色细点。

分布 西藏；锡金，印度，缅甸，印度尼西亚。