

12. 前翅内线明显 背脊蕊夜蛾 *L. quadrinotata*
 前翅内线不明显 暗脊蕊夜蛾 *L. pustulifera*

暗裙脊蕊夜蛾 *Lophoptera squammigera* (Guenée) (图版 XLIII-13)

Lophoptera squammigera Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 55, pl. 14, fig. 13. (澳大利亚)

Lophoptera costata Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 123.

Lophoptera squammigera: Hampson, 1912, Ca. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 177.

Lophoptera costata: Hampson, 1912, ibid. 11: 178. —Holloway, 1976, Moths Borneo, p. 19. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 338.




图 587 暗裙脊蕊夜蛾 *Lophoptera squammigera* (Guenée)

♂ 外生殖器

翅展 35—40mm。头、颈板及胸背前端黑褐色，胸背大部灰色杂少许黑褐色；前翅灰色有淡紫光泽，前缘区一黑褐纵纹，其后缘微呈弧形并衬白色，内线后半双线黑色，环纹黑色，肾纹后半黑褐边，剑纹为黑褐点，外线双线黑褐色波浪形，亚端线双线黑褐锯齿形；后翅黑褐色；腹部暗褐色。雄蛾抱器瓣端分叉，腹一支短，端尖，阳茎细（图 587）。

寄主 糠柴。

分布 湖南、台湾、广东、海南、西藏；越南，印度，斯里兰卡，大洋洲。

齿脊蕊夜蛾 *Lophoptera aleuca* Hampson (图版 XLIII-14)

Lophoptera aleuca Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 178, pl. 178, fig. 18. (澳大利亚昆士兰)