

齿，外侧在6脉前后各有一黄色点，4脉处有一黑纵纹，翅外缘有一列黑点，端线黑色，波浪形，缘毛淡褐色，顶角处间以黑褐色；后翅基部白色，其余暗灰褐色，外线黑色，细锯齿形，亚端线白色，两侧有细黑点，后端内、外侧有微黑纹，微波浪形，翅外缘有一列黑点，端线黑色，缘毛淡褐色，基部有一黄白线；腹部背面棕色。

分布 广东；印度，斯里兰卡。

顶纹蝠夜蛾 *Lophorufa apiciplaga* (Warren) (图版XL-26)

Eugnathia apiciplaga Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 238, pl. 23b, c. (印度尼西亚；印度)

翅展20 mm。头部与胸部白色，下唇须长，向上伸；前翅黄白色，前缘区乳白色，成一宽纵条，其后缘基部达翅后缘，带内布有褐细点，中线褐色，锯齿形，外线弱，褐色，锯齿形，有间断，顶角有一黑斑内斜达外线，亚端线细弱，前段为一白色曲纹，其余黑褐色内侧衬白色；后翅色似前翅，基部乳白色，横脉纹黑褐色，外线褐色外侧衬白色，波曲，亚端线褐色，外侧衬白色，细波浪形，在亚中褶后有2黑褐斑，后一斑大，圆形；腹部黄白色，背面中段带褐色。

分布 海南；印度，印度尼西亚。

美蝠夜蛾 *Lophorufa pulcherrima* (Butler) (图版XL-27)

Egnasia pulcherrima Butler, Ill. Het. colln Br. Mus. 3: 67, pl. 57, fig. 8. (日本)

Lophograpta pulcherrima: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 411.

Lophorufa pulcherrima: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 326. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 810, pl. 196, fig. 43.

翅展27—28 mm。头部棕色，颈板、翅基片及胸部背面红褐色；前翅外线内方红褐色，外方暗棕色，外线黑棕色，自前缘脉外斜近达翅外缘，折成一尖角极度内斜，向后渐扩展，环纹只现一灰白点，肾纹只现二黑点，外侧微黑，近翅外缘有一列黑点；后翅基部红褐色，其余暗棕色；腹部基节背面红褐色，其余灰棕色。

寄主 菝葜、牛尾菜。

分布 河北、广西、四川；朝鲜，日本。

醉蝠夜蛾 *Lophorufa vacillatrix* Hampson (图版XL-28)

Lophorufa vacillatrix: Hampson. 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 231, text fig. 62. (锡金)

Lophorufa vacillatrix: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 240.

翅展25 mm。头部与颈板红褐色杂少许灰色；胸部白色杂褐色，下胸与足白色微带红褐色，前足胫节前缘褐色；前翅黑棕色，前缘区白色成一纵带，布有褐点，前半褐