

尖，外缘曲度平稳，锯齿形，有副室。

种 检 索 表

- 1. 下唇须第二节越过头顶，第三节长尖 2
 下唇须第二节达头顶 醉蝠夜蛾 *Lophoruza vacillatrix*
- 2. 前翅亚端线前半两侧有橙斑 白缘蝠夜蛾 *L. albicostalis*
 前翅亚端线前半两侧无橙斑 3
- 3. 前翅亚端线前半外侧有黄点 月蝠夜蛾 *L. lunifera*
 前翅亚端线前半外侧有黑点 4
- 4. 后翅近臀角有黑点 顶纹蝠夜蛾 *L. apiciplaga*
 后翅近臀角无黑点 美蝠夜蛾 *L. pulcherrima*

白缘蝠夜蛾 *Lophoruza albicostalis* (Leech) (图版 XL-24)

Mestleta albicostalis Leech, 1889, Entom. 22: 65, pl. 2, fig. 10. (浙江宁波, Foochau)
Lophoruza albicostalis: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 226, text fig. 60.
Eugnathia albicostalis: Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. 3: 271.

翅展 21 mm。头部与胸部白色杂褐色，下胸与足白色微带褐色；前翅浅红褐色，前缘区白色，成一宽纵条，其后缘达中室，基部达翅后缘，带的前部带有褐色，基线、内线、中线均不显，肾纹只现 2 黑点，外线白色外弯，外区前缘脉有一列白点，亚端线白色，内侧前缘区有黑点，6 脉前后有三角形小黑斑，线内侧有一褐带，外侧带黄色，近翅外缘有一列黑点，端线黑色；后翅白色微带红褐色，基部白色成一小三角区，内区红褐色，横脉纹红褐色，外线黑褐色，中段外弯，亚端线白色，内侧衬黑褐色，后段内侧有一黑纹，近翅外缘有一列黑点，端线黑色；腹部白色，中部几节背面带褐色，毛簇黑褐色。

分布 浙江、福建、海南。

月蝠夜蛾 *Lophoruza lunifera* (Moore) (图版 XL-25)

Mestleta lunifera Moore, 1884—87, Lep. Ceyl. 3: 209, pl. 175, fig. 3. (斯里兰卡)
Zagira lunifera: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 345.
Eugnathia lunifera: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 238.
Lophoruza lunifera: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 227. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 326. ——Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 810.

翅展 21 mm。头部与颈板棕色杂以灰色；胸部白色；前翅以后缘内 1/3 至 6 脉的黑线划界，线内方白色，线外方暗灰褐色，并延伸至顶角，前缘区密布暗灰褐色细点，外线黑色，后半成为黑点列，亚端线白色，在 6—7 脉处为新月形，在 3、4 脉处成外凸

齿，外侧在6脉前后各有一黄色点，4脉处有一黑纵纹，翅外缘有一列黑点，端线黑色，波浪形，缘毛淡褐色，顶角处间以黑褐色；后翅基部白色，其余暗灰褐色，外线黑色，细锯齿形，亚端线白色，两侧有细黑点，后端内、外侧有微黑纹，微波浪形，翅外缘有一列黑点，端线黑色，缘毛淡褐色，基部有一黄白线；腹部背面棕色。

分布 广东；印度，斯里兰卡。

顶纹蝠夜蛾 *Lophorufa apiciplaga* (Warren) (图版XL-26)

Eugnathia apiciplaga Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 238, pl. 23b, c. (印度尼西亚；印度)

翅展20 mm。头部与胸部白色，下唇须长，向上伸；前翅黄白色，前缘区乳白色，成一宽纵条，其后缘基部达翅后缘，带内布有褐细点，中线褐色，锯齿形，外线弱，褐色，锯齿形，有间断，顶角有一黑斑内斜达外线，亚端线细弱，前段为一白色曲纹，其余黑褐色内侧衬白色；后翅色似前翅，基部乳白色，横脉纹黑褐色，外线褐色外侧衬白色，波曲，亚端线褐色，外侧衬白色，细波浪形，在亚中褶后有2黑褐斑，后一斑大，圆形；腹部黄白色，背面中段带褐色。

分布 海南；印度，印度尼西亚。

美蝠夜蛾 *Lophorufa pulcherrima* (Butler) (图版XL-27)

Egnasia pulcherrima Butler, Ill. Het. colln Br. Mus. 3: 67, pl. 57, fig. 8. (日本)

Lophograpta pulcherrima: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 411.

Lophorufa pulcherrima: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 326. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 810, pl. 196, fig. 43.

翅展27—28 mm。头部棕色，颈板、翅基片及胸部背面红褐色；前翅外线内方红褐色，外方暗棕色，外线黑棕色，自前缘脉外斜近达翅外缘，折成一尖角极度内斜，向后渐扩展，环纹只现一灰白点，肾纹只现二黑点，外侧微黑，近翅外缘有一列黑点；后翅基部红褐色，其余暗棕色；腹部基节背面红褐色，其余灰棕色。

寄主 菝葜、牛尾菜。

分布 河北、广西、四川；朝鲜，日本。

醉蝠夜蛾 *Lophorufa vacillatrix* Hampson (图版XL-28)

Lophorufa vacillatrix: Hampson. 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 231, text fig. 62. (锡金)

Lophorufa vacillatrix: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 240.

翅展25 mm。头部与颈板红褐色杂少许灰色；胸部白色杂褐色，下胸与足白色微带红褐色，前足胫节前缘褐色；前翅黑棕色，前缘区白色成一纵带，布有褐点，前半褐