

缘，后端与白色斜带靠近，线外方褐灰色，端线细，黑色，缘毛淡褐灰色；后翅黄色，后缘区有一黑纵条，自基部伸达臀角，与一黑纹相遇，端区有一黑带，前宽后窄，后端达2脉，黑带外的缘毛黑色，其余黄色；腹部黑褐色。

分布 海南、云南；孟加拉国，印度，斯里兰卡。

曲夜蛾属 *Loxioda* Warren

Loxioda Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World, 3: 386.

Type-species: *Phryys similis* Moore.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节被密鳞，第三节小，雄蛾触角线形，有鬃毛；胸部被平滑鳞片，无毛簇；前翅三角形，顶角尖而外突，腹部无毛簇。

种 检 索 表

- 前翅外线清晰 斜线曲夜蛾 *Loxioda parva*
- 前翅外线不清晰 曲夜蛾 *L. similis*

曲夜蛾 *Loxioda similis* (Moore) (图版 LXIII-19)

Phryys similis Moore, 1882, Lep. At. p. 174, pl. 6, fig. 5. (印度)

Madopa lutealis Snellen, 1884, Tijd. ent. 27: 213.

Phryys ochreifascia Hampson, 1891, Ill. Het. Colln Br. Mus. 8: 17, 83.

Acantholipes similis: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 521.

Loxioda similis: Hollwory, 1976, Moths Borneo p.36. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 373.

翅展29 mm。头部与胸部黄白色带褐色，下唇须第二节外侧褐黑色，第三节极细短，足外侧带褐色；前翅黄白色带褐色，内线双线褐色，不明显，中线褐色，较粗，微曲内斜，环纹只现一黑点，肾纹不显，外线双线褐色，较直内斜，在中褶前不明显，亚端线暗褐色，自顶角微内弯至翅后缘，内侧衬淡黄色及一黑褐线，外侧色较暗，翅外缘有一列黑点，缘毛中有一褐线；后翅黄白色，端区微带褐色，中线不清晰，双线褐色，外线双线褐色，直线内斜，亚端线褐色模糊，端线深褐色，缘毛中有一褐线；腹部黄白色微带褐色。

雄性外生殖器的钩形突长弯，抱器瓣极窄，有一短齿形抱器背突。

分布 四川；印度。

斜线曲夜蛾 *Loxioda parva* Sugi (图版 LXIII-20)

Loxioda parva Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 884, pl. 219, figs. 1, 2. pl. 377, fig. 2