

白色针毛甚密,致使白色喉斑不明显。

据昆明动物研究所采自盈江昔马的雌性标本(76304)量衡度(衡:克;长度:毫米)如下: 体重 4350, 体长 560, 尾长 260, 后足长 100, 耳长 19, 颅全长 101.8, 颅基长 99.5, 口盖长 45.4, 颧弓长 61.4, 眶间宽 16.2 后头宽 53.4, 上齿列长 32.4, 下齿列长 38.1。

(4) 西藏亚种 *Lutra lutra kutab* Schinz

1844 *Lutra kutab* Schinz, Syn. Mamm. 354. (模式产地: 克什米尔地区)。

分布于西藏西部。

据 Pocock (1941) 记述, *kutab* 成年水獭体重约 7.5 公斤。体背面毛色因绒毛褐色而显得较深暗, 呈深灰褐色。腹面绒毛没有黄褐色调而呈灰色。趾爪周围被毛灰色。记载标本: 体重 6975 克, 体长 635 毫米, 尾长 444 毫米, 后足长 124.4 毫米。

分类 据 Pocock (1941) 记述 *kutab* 是以从西藏获得的一张獭皮为根据。此后未见国内有采获 *kutab* 标本的报道。我国所称的藏獭未必就是 *kutab*。北京畜产进出口公司的验皮者认为: 西藏的水獭不全是“藏獭”。“藏獭”体形甚大, 针毛尖挺而柔软, 绒毛尖端稍染紫色, 绒根呈多波形弯曲(称菊花根)。这种藏獭数量甚少, 过去每年有十多张进库, 近年来极罕见。据说主要分布于奇林湖, 腾格里湖, 怡里鄂木湖等地。然而, 西藏亚种产于与西藏相毗连的喀什米尔, 从地理位置分析, 西藏有 *kutab* 分布是可能的。

(5) 海南亚种 *Lutra lutra hainana* Xu et Liu 1983*

1870 *Lutra chinensis* Swinhoe, Proc. Zool. Soc. London, 624.

正模: 0300 号, ♀, 1963 年 11 月 18 日采于海南岛五指山, 水满。

副模: 0298 号, ♀, 1963 年 11 月 13 日采地同正模。

鉴别特征 颈喉部的针毛白色, 绒毛尖端赤黄褐色, 无界线分明的白斑。体形较小, 体重约 4 公斤。

描记 海南水獭是本种水獭中体形最小的类型, 体长 540—560 毫米, 体重在 4 公斤左右。外形和毛色均与中华亚种相同, 但从颈喉部的白斑完全可以区别。中华水獭的白色喉斑周围界线分明, 针毛和绒毛一律白色; 海南水獭的喉部针毛白色, 绒毛尖端赤黄褐色。

头骨扁形, 吻粗短而额部较长, 脑室呈扁梨形。眶间狭窄, 眶上突呈小乳头状突起。成年水獭头骨各骨缝多愈合。听泡小而扁平, 乳突不明显。

上颌门齿成一横列, 第三对门齿较大, 约为其余两对的二倍。上犬齿强大, 呈圆锥形。第一上前臼齿很小, 紧附于犬齿内侧。

* 新亚种订名人徐龙辉, 刘振和。

下颌第一对门齿最小,位于第二对门齿之前外侧,第二,三对门齿顺次增大。犬齿较短且向后弯,紧靠门齿,其前缘与门齿前缘几乎在一直线上。三个前臼齿紧跟于犬齿之后,裂齿长方形,后臼齿小,齿突不明显。齿式为: $\frac{3 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 1}{3 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 2} = 36$ 。

量衡度:

外 形 (衡: 克; 度: 毫米)

标本号	性 别	体 重	体 长	尾 长	后 足 长	耳 长
0300	♀	4000	540	345	90	19
0298	♀	3750	560	300	93	20

头 骨 (毫米)

标本号	性别	颅全长	腭长	颧宽	后头宽	臼齿间宽	眶鼻间宽	上齿列长	下齿列长
0300	♀	100.3	42.7	62	55.8	31.1	25	32.7	39
0298	♀	99.3	42.1	—	53.8	30.6	26	33.2	38.3

分类 海南水獭最早由 Swinhoe (1870) 报道,订为 *Lutra chinensis*。此后所有海南水獭的报道,均列入中华亚种 (*L. l. chinensis*)。经研究,发现海南水獭有独异之处。中华亚种体形较大,颊喉部白斑明显,其针毛与绒毛均纯白色,界线分明;海南水獭体形较小,颊喉部无界线分明的白斑,仅因此处白色针毛较多而比腹部颜色白,绒毛尖端赤黄褐色。

据 Pocock (1941) 的记述,从苏门答腊分布到越南的亚种 *L. l. barang* 是已知水獭各亚种中体形最小的种类。但海南水獭之最大量度均未达到 *barang* 亚种之最低数字(体长 563.9 毫米,尾长 370.8 毫米,后足长 106.7 毫米)。*barang* 之颊喉部白色毛区界线分明,亦为两者之显著区别。若与 *nair*, *monticola*, *kutab* 和指名亚种相比较,差异就更大了,地理位置亦相隔较远,不再罗列对比。

海南水獭的特征,经过检查数百件海南水獭皮张的验证,与中华水獭皮混放一起时极易分开。

30. 江獭 *Lutra perspicillata* Geoffroy (图版五: 图 1)

1826 *Lutra perspicillata* I. Geoffroy, Dict. Class. Hist. Nat. 9:519.

1879 *Lutra monticola* Anderson, Anat. and Zool. Researches Western Yunnan, 207.

1938 *Lutra tarayensis* Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, 8: 319.

别名: 印度水獭、海獭、咸水獭(广东)、滑獭(商品名)。

鉴别特征 体形较大,鼻垫上缘与毛区的交界几乎成一直线。四肢趾爪很小,全蹼。体背毛浅黑褐色,针毛甚短。尾较短而扁阔,后半段被稀疏的短毛。(图 II-5)

形态