

白色针毛甚密,致使白色喉斑不明显。

据昆明动物研究所采自盈江昔马的雌性标本(76304)量衡度(衡:克;长度:毫米)如下: 体重 4350, 体长 560, 尾长 260, 后足长 100, 耳长 19, 颅全长 101.8, 颅基长 99.5, 口盖长 45.4, 颧弓长 61.4, 眶间宽 16.2 后头宽 53.4, 上齿列长 32.4, 下齿列长 38.1。

#### (4) 西藏亚种 *Lutra lutra kutab* Schinz

1844 *Lutra kutab* Schinz, Syn. Mamm. 354. (模式产地: 克什米尔地区)。

分布于西藏西部。

据 Pocock (1941) 记述, *kutab* 成年水獭体重约 7.5 公斤。体背面毛色因绒毛褐色而显得较深暗, 呈深灰褐色。腹面绒毛没有黄褐色调而呈灰色。趾爪周围被毛灰色。记载标本: 体重 6975 克, 体长 635 毫米, 尾长 444 毫米, 后足长 124.4 毫米。

**分类** 据 Pocock (1941) 记述 *kutab* 是以从西藏获得的一张獭皮为根据。此后未见国内有采获 *kutab* 标本的报道。我国所称的藏獭未必就是 *kutab*。北京畜产进出口公司的验皮者认为: 西藏的水獭不全是“藏獭”。“藏獭”体形甚大, 针毛尖挺而柔软, 绒毛尖端稍染紫色, 绒根呈多波形弯曲(称菊花根)。这种藏獭数量甚少, 过去每年有十多张进库, 近年来极罕见。据说主要分布于奇林湖, 腾格里湖, 怡里鄂木湖等地。然而, 西藏亚种产于与西藏相毗连的喀什米尔, 从地理位置分析, 西藏有 *kutab* 分布是可能的。

#### (5) 海南亚种 *Lutra lutra hainana* Xu et Liu 1983\*

1870 *Lutra chinensis* Swinhoe, Proc. Zool. Soc. London, 624.

正模: 0300 号, ♀, 1963 年 11 月 18 日采于海南岛五指山, 水满。

副模: 0298 号, ♀, 1963 年 11 月 13 日采地同正模。

**鉴别特征** 颈喉部的针毛白色, 绒毛尖端赤黄褐色, 无界线分明的白斑。体形较小, 体重约 4 公斤。

**描记** 海南水獭是本种水獭中体形最小的类型, 体长 540—560 毫米, 体重在 4 公斤左右。外形和毛色均与中华亚种相同, 但从颈喉部的白斑完全可以区别。中华水獭的白色喉斑周围界线分明, 针毛和绒毛一律白色; 海南水獭的喉部针毛白色, 绒毛尖端赤黄褐色。

头骨扁形, 吻粗短而额部较长, 脑室呈扁梨形。眶间狭窄, 眶上突呈小乳头状突起。成年水獭头骨各骨缝多愈合。听泡小而扁平, 乳突不明显。

上颌门齿成一横列, 第三对门齿较大, 约为其余两对的二倍。上犬齿强大, 呈圆锥形。第一上前臼齿很小, 紧附于犬齿内侧。

\* 新亚种订名人徐龙辉, 刘振和。