

怀孕期间仍返回原领域。孕期为 67—74 日。每胎生 1—4 仔, 幼仔毛稀眼闭, 在 16—17 日后睁眼。一月后开始食固体食物, 哺乳期近 5 个月。幼仔和母兽一起生活, 直至下次繁殖季节前才分开。雄性需 33 个月, 雌体需 21 个月即可达性成熟。

幼仔在近一周岁时, 开始逐步建立自己的领域。首先从足迹所至的小范围为起点, 不断熟悉环境, 活动越来越大, 扩展成为其领域。

在亚洲猞猁的天敌是豹, 在欧洲则是狼。

经济意义 猞猁皮是直毛细皮中比较珍贵的品种, 因背腹毛绒长短不一, 制裘时常把背腹部分开。皮张检验以冬皮为佳, 但注意其季节变化, 以初春时质量优良, 色纹更美。

分类 在欧洲对猞猁的记载, 曾出现过较多的同物异名, 反映着猞猁斑点、毛色的变化或南北差异。北方个体大、毛长, 南方个体小而毛短。据记载欧洲猞猁, 在一地区内毛色和体纹有显然变化。有些背部和体侧具有清晰斑点, 有些则近于无斑。例如, 在北欧的斯堪的那维亚半岛上, 把具斑点者称为“猫猞猁”, 近于无斑者为“狼猞猁”。

我国毛皮业资料表明, 在北方冬皮内的初春皮(即接近立春时), 其皮的色泽才变鲜艳, 斑点亦显清晰, 毛绒细长而灵活, 此时毛皮质量为最佳冬皮, 似表明季节性变化亦或许与繁殖时期的来临有关。

我国毛皮业对国产猞猁皮, 常依毛色大略区别为二。即“羊猞猁”和“马猞猁”。个体较大, 毛色灰棕; 背毛毛尖青白色, 在全身棕色色泽上类似敷以白色浮霜; 斑点色浅呈棕红色或斑点不分明者称为“羊猞猁”。个体较小, 毛色棕红, 体后部及四肢上部具深褐色斑点者称“马猞猁”。前者见于东北三省、河北、新疆、甘肃、青海、西藏和四川、云南。后者见于新疆及西藏。所谓羊猞猁和马猞猁, 并非截然分明。既有混杂过渡, 亦与季节性有关。例如在华北和西南等省区, 亦可见有棕黄色个体, 具斑点但不显明者。

我国产猞猁, 一般说来, 北方者个体略大、毛长; 毛色灰棕、斑点色浅而不够分明, 但初春皮例外。产于西南方者个体略小、毛短; 色泽较深些, 毛色棕红、草黄色; 斑点或明显或较分明。在西藏和新疆则二者皆有。

《新疆南部鸟兽》一书(钱燕文等, 1965), 谓我国西北包括南疆在内, 均属 *L. l. isabellina* 亚种。一般认为它的毛色变异很大。南疆且末标本毛色浅淡, 呈沙棕色, 此与北疆的标本深红棕色并染鲜明的霜状花白色调, 形成显著的差别。

以往记载猞猁有二亚种。*isabellina* 模式产地西藏, *kamensis* 模式产地四川西部(原西康)。由于体色有季节变化今暂划为中国亚种 (*L. l. isabellina*), 亦可能包括着不同的亚种。

亚种

(1) 中国亚种 *Lynx lynx isabellina* Blyth

1847 *Felis isabellina* Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, 16: 1178. (模式产地: 西藏)。

分布见种。

XXX. 金猫属 *Profelis* Severtzov, 1858

1858 *Profelis* Severtzov, Rev. Mag. Zool. 10:387.

参阅: Allen, 1938, 464—469; Pocock, 1939, 351—364; Ellermann 等, 1950, 311—312; 寿振黄等, 1962, 397—399; Grzimek, 1975, 315—316.

本属包括三种,即分布于非洲丛林的非洲金猫 (*P. aurata*)。分布于我国南方以及南亚、东南亚地区的金猫 (*P. temmincki*) 和加里曼丹岛的海湾金猫 (*P. badia*)。三者中,前二种身体大小相似,后者略小。

本属在齿式上相同于猫属。第一上前臼齿或缺。金猫属在进化史上是小型猫类中属于古老的类群。很可能早在第三纪中期,气候较现代温暖时,迁徙入非洲而呈现为目前的分布状况 (Grzimek, 1972)。

金猫和非洲金猫呈现出彼此类似的色型变化。即多数为肉桂色、淡红褐色。亦有全黑的、栗褐色的、银灰色的、石板灰等个体毛色变异。甚或介乎其间的各式过渡毛色。此外,我国产金猫更有全身斑驳似豹猫纹型的灰褐色类型。若以体纹斑驳似为古老特征,那么我国南方地区则可能是金猫属的起源地。

在食肉目中,类似于金猫属的多色型毛色变化,尚见有南美鼬猫 (*Herpailurus yagouaroundi*)。

51. 金猫 *Profelis temmincki* Vigors et Horsfield (图版十: 图 1)

1827 *Felis temminckii* Vigors & Horsfield, Zool. J. 3:451 (模式产地: 苏门答腊)

1831 *Felis moormensis* Hodgson, Gleanings in Science, 3:177.

1863 *Felis nigrescens* Gray, Hongson's Cat. Mamm. Nepal in B. M., ed. 2, 4.

1872 *Felis tristis* Milne-Edwards, Rech. Mamm. 223, pl. 31.

1898 *Felis dominicanorum* Sclater, Proc. Zool. Soc. 2, pl. 1.

1904 *Felis semenovi* Satunin, Ann. Mus. Zool. Acad. Sci. St. Petersburg. 9:524.

1908 *Felis temmincki mitchelli* Lydekker, Proc. Zool. Soc. 433.

1922 *Felis (Catopuma) melli* Matschie, Arch. Nat. 88, A, 10:36.

1924 *Felis temminckii bainsei* Sowerby, China J. Sci. & Arts, 2:352.

1926 *Felis temmincki badiodorsalis* Howell, Proc. Biol. Soc. Washington, 39:143.

别名: 原猫、黄虎(广西),红春豹或红金猫、芝麻豹或灰金猫、狸豹或花金猫(商品名或动物名)。

鉴别特征 是一种较大型猫类、貌似小豹,尾略显短。四肢上部具斑点。

形态

外形: 体长 750—1100 毫米,尾长 400—560 毫米。体重 10—15 公斤。在猫类中是外耳显著能动者,听觉颇佳。

3 种金猫 = 3 个色型毛色