

复眼大，雄蛾触角线形；胸部主要被鳞片，无毛簇；前翅有一副室；后翅5脉发达，自中室下角发出，3脉自中室下角下侧发出；腹部第一、二节背面有鳞簇。

### 鹗夜蛾 *Negeta signata* (Walker) (图版XL-2)

*Ariolica? signata* Walker, 1864, J. Linn. Soc. Zool. 7: 54. (沙捞越)

*Doranaga apicalis* Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 533.

*Nertobriga signata*: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 614. ——Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 449. ——Holloway, 1976, Moths Borneo p. 28. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 284.

翅展24—28 mm。头、胸及腹部褐色，额褐白色，胸部带紫色；前翅红褐色带紫灰色，内线暗褐色，波曲内斜，在中室前有折曲，肾纹只现一黑点及一白点，分别位于中室横脉的前、后端，外线黑褐色，自顶角后外弯，7脉后内斜，前缘区近顶角有一扁三角形白斑，亚端线黑色，有间断，自外线折角处外弯，波浪形，翅外缘有一列黑点；后翅黑褐色，缘毛褐白色；腹部浅褐色，毛簇端部黑褐色，腹面褐白色。

**分布** 西藏；印度，斯里兰卡，新加坡，马来西亚，菲律宾，大洋洲。

## 土夜蛾属 *Macrochthonia* Butler

*Macrochthonia* Butler, 1881, Trans. ent. Soc. Lond. p. 599.

Type-species: *Macrochthonia fervens* Butler.

*Eccopteroma* Staudinger, 1892, Mem. Lep. 6: 5—6.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，额平滑，上方有一毛簇，复眼圆大；雄蛾触角双栉形，尖端有纤毛（雌蛾触角仅有纤毛）；胸部鳞片和毛混生，前胸有三角形毛簇；胫节有毛；腹部比较细长，仅基部两节有毛簇；前翅顶角微伸出成一锐角，外缘在顶角后方内削。

### 土夜蛾 *Macrochthonia fervens* Butler (图版XL-3)

*Macrochthonia fervens* Butler, 1881, Trans. ent. Soc. Lond. p. 599. (日本东京)

*Calymnia falcata* Graeser, 1889, Berl. ent. Zeit. 33: 257.

*Calymnia pyrausta* Graeser, Berl. ent. Zeit. 33: 258.

*Macrochthonia fervens*: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 636. ——Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World, 3: 300. ——Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 152. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 324.

翅展31—40 mm。头部与胸部红褐色，下胸微白，足褐色，跗节各节间有白环；前翅红褐色微带紫色并布有暗褐细点，基线褐色内斜，自前缘脉至1脉，内线褐色，自

前缘脉内斜至中室后缘折向外再内斜，中线褐色，自前缘脉微曲内斜至中室后缘，外线褐色，自前缘脉外斜至8脉折角内斜，后半与内线平行，亚端线褐色，波浪形，有间断，在中褶处内凸，在亚中褶处外凸近达翅外缘，翅外缘有一列黑点，外缘近顶角处凹；后翅黄白色；腹部白色，背面带褐色。

**分布** 黑龙江、江苏、浙江、湖北、江西；日本。

## 裁夜蛾属 *Pterogonia* Swinhoe

*Pterogonia* Swinhoe. 1891, Trans. ent. Soc. Lond. p. 152.

Type-species: *Pterogonia episcopalis* Swinhoe.

*Craspedogonia* Hampson, 1893, Ill. Het. Colln Br. Mus. 9: 29, 117.

喙发达，下唇须向上伸，第三节长，额无突起，有尖毛簇，复眼大，触角线形；胸部主要被鳞片；前翅顶角尖而外突，外缘中部多外突成角，后半内斜，有一副室；后翅5脉发达。

### 种 检 索 表

前翅中室端部有一三角形银斑 ..... 裁夜蛾 *Pterogonia episcopalis*  
前翅中室端部无三角形银斑 ..... 点肾裁夜蛾 *P. aurigutta*

### 裁夜蛾 *Pterogonia episcopalis* Swinhoe (图版XL-4)

*Pterogonia episcopalis* Swinhoe, 1891, Trans. ent. Soc. Lond. p. 152, text fig. (印度)

*Pterogonia episcopalis*: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 363. ——Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 648. ——Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 451, pl. 43g. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 324.

翅展41 mm左右。头部及胸部淡紫灰色杂少许褐色，头顶及颈板有褐纹；前翅淡紫褐色，内半较灰，布有黑色细点及黑褐色细纹，前缘区基部锈褐色，基线及内线细弱，暗褐色，稍间断，内线前半曲折，中室端部有一银斑，呈三角形，围以红棕色边，前后各一银点，内侧有一黑棕斜线，后方有一黑棕斑，外线暗褐色，不完整，前段曲折，中段外弯，亚端线为一列黑点，前半粗，略呈锯齿形，内侧衬银色，缘毛端部黑棕色；后翅淡褐色，端区黑褐色；腹部浅褐色，端部黑褐色。

**分布** 海南；印度，新加坡等。

### 点肾裁夜蛾 *Pterogonia aurigutta* (Walker) (图版XL-5)

*Thalatta aurigutta* Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1793. (新加坡)

*Pterognia* [sic] *irrorata* Dudgeon, 1905, J. Bomb. N. H. Soc. 16: 402.