

分布 浙江、湖北、湖南。

嵌瑙夜蛾 *Maliattha tegulata* Butler (图版 XLI-32)

Acontia tegulata Butler, 1889, Ill. Het. Br. Mus. 7: 63, pl. 129, fig. 1. (印度)

Hyela tegulata: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 308.

Eustrotia tegulata: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 584. ——Chen, 1993, Ins. Hengduan Mts., p. 1020.

Maliattha tegulata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 280, pl. 26a.

翅展 22 mm。头部白色杂有少许褐色，触角赭黄色，有黑褐环，下唇须带有赭黄色并布黑褐细点；胸部背面白色杂有少许褐色，颈板杂暗褐色，足跗节黑褐色，各节节间有赭黄环；前翅白色，前缘区基部黑褐色，中室近基部有一黑点，中线黑色，细波浪形，外侧有一褐色带，其外缘微曲外斜，后端近达臀角，端区有一大黑斑，其内缘自顶角内斜至中褶，折角外斜至亚中褶端部，其外缘达端线，后者黑色，有间断；后翅白色，向端部渐带黑褐色；腹部白色带褐色。

分布 江西、四川；印度。

本种前翅中带宽，端区黑斑大，与标瑙夜蛾可鉴别。

直带瑙夜蛾 *Maliattha ritsemae* (Snellen) (图版 XLI-33)

Erastria ritsemae Snellen, 1880, Tijds. v. Ent. 23: 57, pl. 5, fig. 2. (印度尼西亚)

Eustrotia thermozona Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 588.

Maliattha ritsemae: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 281. ——Holloway, 1979, Lep. New Caled. p. 437.

翅展 20 mm。头、胸白色，带有金褐色；前翅白色，前缘区基部金褐色，中线黑色，微波浪形，外侧金褐色，成一带状，外线双线黑色，线间白色，外一线弱，自前缘脉外斜至 6 脉后内斜并波曲，端区金褐色，成带状，其内缘在 4—6 脉间内突，端区前缘脉上有几个黑点，亚端线模糊，黑色，缘毛白色杂少许褐色，中有一黑线；后翅白色微带褐色，缘毛中有一褐线；腹部白色带全褐色。

分布 海南；印度尼西亚。

斜带瑙夜蛾 *Maliattha quadripartita* (Walker) (图版 XLI-34)

Acontia quadripartita Walker, 1865, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 33: 786. (印度)

Hyela quadripartita: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 308.

Eustrotia quadripartita: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 589, pl. 166, fig. 10.

Maliattha quadripartita: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 281,

翅展 18 mm。头部与颈板白色带赭黄色，触角黑色，有白环，下唇须外侧有黑纹，颈板杂有黑色；前胸背面黑色，其余白色；下胸与足赭白；前足胫节与跗节有黑斑；前翅白色，前缘基部黑色，中室基部有一黑点，翅中部有一黑带，其内缘微波曲，外缘中段外拱，全带略外斜，端区有一黑带，其内缘中段内突成齿，前缘有二白点，带的后部窄尖，近达臀角，翅外缘有一列黑点；后翅白色微带黑褐色，端线黑色，缘毛中有一黑线，腹部浅褐色。

分布 云南；缅甸，印度，锡金。

俚夜蛾属 *Lithacodia* Hübner

Lithacodia Hübner, 1818, Zutr. Samml. exot, Schmett. 1: 18.

Type-species: *Lithacodia bellicula* Hübner.

Motama Moore, 1882, Lep. Atk. p. 110.

Anchiroe Saalmuller, 1891, Lep. Madag. p. 350.

Anchirrhoe Bertkau, 1892, Arch. Naturg. 58 (2) (2): 188.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，前缘被鳞，额平滑，复眼大而圆，雄蛾触角有纤毛；腹部主要被鳞片，前胸无毛簇，胫节微有毛，腹部基部几节有毛簇，第三、四节上的毛簇较大；前翅顶角较钝，外缘斜。

种 检 索 表

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. 额有圆突 | 白肾俚夜蛾 <i>Lithacodia martjanovi</i> |
| 额无突起 | 2 |
| 2. 肾纹白色，前细后粗 | 3 |
| 肾纹匀称 | 4 |
| 3. 后翅黄白色 | 华俚夜蛾 <i>L. mandarina</i> |
| 后翅褐色 | 锈色俚夜蛾 <i>L. fentoni</i> |
| 4. 前翅中区后半有方形黑斑 | 黑斑俚夜蛾 <i>L. melanostigma</i> |
| 前翅中区后半黑斑非方形或无斑 | 5 |
| 5. 肾纹不规则形 | 衰俚夜蛾 <i>L. senex</i> |
| 无肾纹 | 6 |
| 6. 前翅外缘外侧带白色 | 7 |
| 前翅外缘外侧不带白色 | 10 |
| 7. 前翅外区带有白色 | 8 |
| 前翅外区不带白色 | 15 |
| 8. 前翅基区白色 | 9 |
| 前翅基区非白色 | 木俚夜蛾 <i>L. nemorum</i> |