

分布 浙江、湖北、湖南。

嵌瑙夜蛾 *Maliattha tegulata* Butler (图版 XLI-32)

Acontia tegulata Butler, 1889, Ill. Het. Br. Mus. 7: 63, pl. 129, fig. 1. (印度)

Hyela tegulata: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 308.

Eustrotia tegulata: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 584. ——Chen, 1993, Ins. Hengduan Mts., p. 1020.

Maliattha tegulata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 280, pl. 26a.

翅展 22 mm。头部白色杂有少许褐色，触角赭黄色，有黑褐环，下唇须带有赭黄色并布黑褐细点；胸部背面白色杂有少许褐色，颈板杂暗褐色，足跗节黑褐色，各节节间有赭黄环；前翅白色，前缘区基部黑褐色，中室近基部有一黑点，中线黑色，细波浪形，外侧有一褐色带，其外缘微曲外斜，后端近达臀角，端区有一大黑斑，其内缘自顶角内斜至中褶，折角外斜至亚中褶端部，其外缘达端线，后者黑色，有间断；后翅白色，向端部渐带黑褐色；腹部白色带褐色。

分布 江西、四川；印度。

本种前翅中带宽，端区黑斑大，与标瑙夜蛾可鉴别。

直带瑙夜蛾 *Maliattha ritsemae* (Snellen) (图版 XLI-33)

Erastria ritsemae Snellen, 1880, Tijds. v. Ent. 23: 57, pl. 5, fig. 2. (印度尼西亚)

Eustrotia thermozona Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 588.

Maliattha ritsemae: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 281. ——Holloway, 1979, Lep. New Caled. p. 437.

翅展 20 mm。头、胸白色，带有金褐色；前翅白色，前缘区基部金褐色，中线黑色，微波浪形，外侧金褐色，成一带状，外线双线黑色，线间白色，外一线弱，自前缘脉外斜至 6 脉后内斜并波曲，端区金褐色，成带状，其内缘在 4—6 脉间内突，端区前缘脉上有几个黑点，亚端线模糊，黑色，缘毛白色杂少许褐色，中有一黑线；后翅白色微带褐色，缘毛中有一褐线；腹部白色带全褐色。

分布 海南；印度尼西亚。

斜带瑙夜蛾 *Maliattha quadripartita* (Walker) (图版 XLI-34)

Acontia quadripartita Walker, 1865, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 33: 786. (印度)

Hyela quadripartita: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 308.

Eustrotia quadripartita: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 589, pl. 166, fig. 10.

Maliattha quadripartita: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 281,