

*Maliattha separata*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 278.

翅展 18 mm。头、胸、腹及前翅白色带褐色；前翅基部带赭色，内线黑褐色，直线内斜，外线双线黑色，内线、外线间棕色近三角形，肾纹窄，中央黑色围以白环及黑边，中室外方各翅脉有衬白的黑色纹，亚端线灰白色波浪形，内侧各翅脉间有棕色纵纹，端线棕色，内侧一赭白线；后翅灰棕色。

**分布** 福建、广东、海南；印度，缅甸，斯里兰卡，马来西亚，印度尼西亚。

### 大斑璫夜蛾 *Maliattha lattivita* (Moore) (图版 XLI-27)

*Bankia lattivita* Moore, 1881, Proc. zool. Soc. Lond. p. 373. (印度)

*Lithacodia lattivita*: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 329.

*Maliattha lattivita*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 278.

翅展 20 mm。头、胸褐色杂白色；前翅棕褐色，内线内方白色带褐色，内线褐色内斜，肾纹小，黑色白边，外线双线黑褐色，后半外斜至臀角，内、外线间色暗，似三角形，亚端线白色，外侧亚中褶与 5 脉间有黑褐点，缘毛白色；后翅浅棕色；腹部棕褐色。

**分布** 云南；印度，斯里兰卡。

### 标璫夜蛾 *Maliattha signifera* (Walker) (图版 XLI-28)

*Acontia signifera* Walker, 1858 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 12: 796. (印度)

*Lithacodia signifera*: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 504. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 330.

*Maliattha signifera*: Warren, in Seitz, Macrolep. World 11: 279. ——Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 814.

翅展 16 mm。头、胸白色杂少许褐色；前翅白色，前缘区基部二褐斑，内一斑之后有黑点，中室近基部一黑点，内线、中线黑色，前者波浪形外斜，后外侧一褐色带，呈二叉形沿中室后缘至 6 脉基部，肾纹白色，中有二黑点，或黑曲纹，外侧一小黑斑，外线双线黑褐色锯齿形，内线与外线间大部黑褐色，亚端线内侧一列楔形黑褐纹；后翅褐白，端区色暗；腹部褐白色。

**分布** 河北、江苏、湖北、江西、福建、广东、广西；日本，朝鲜，印度，缅甸，斯里兰卡，马来西亚，大洋洲等。

### 路璫夜蛾 *Maliattha vialis* (Moore) (图版 XLI-29)

*Acontia vialis* Moore, 1882, Lep. Atk. p. 135. (印度)

*Lithacodia vialis*: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 507. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 330.

*Maliattha vialis*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 279. ——Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 815.

翅展 15 mm。头、胸白色带浅褐色；前翅顶角至后缘中部为一分界线，内方黄白色，外方紫棕褐色，中室端部赤褐色，基线仅前端可见黑纹，内线、外线黑色，内线中部外侧一黑点，外线双线，前端为白纹，线内侧在 3—5 脉间有白纹，亚端线黄白色锯齿形，内侧较黑，翅外缘一列黑纹；后翅污褐色，缘毛线赭黄色；腹部黄白带浅褐色。

**分布** 黑龙江、河南、浙江、湖南、福建、四川；日本，锡金，印度。

### 丽瑙夜蛾 *Maliattha bella* (Staudinger) (图版 XLI-30)

*Thalpochares bella* Staudinger, 1888, Stett. ent. Zeit. 49: 264. (西伯利亚)

*Lithacodia bella*: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 134.

*Maliattha bella*: Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 3: 276, pl. 51m. ——Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 815.

翅展 18 mm。头部白色带褐色，触角暗褐色，下唇须外侧黑褐色；胸部背面白色带红褐色，前足胫节黑褐色，有白斑纹；前翅前缘 2/3 至后缘 1/3 有一内斜线，线内方白色，前缘区带黑褐色，线外方黑褐色杂紫灰色，端区红褐色，基线仅在前缘脉上现一黑点，内线细弱，在前缘脉上为一黑点，其后灰白色达中室后缘，中室后不明显，环纹只现一黑点，肾纹为一黑点于中室下角，外线双线黑色，线间白色，在前缘区不见黑线，自前缘脉后外弯至 4 脉后内弯，在中褶处内凸，3 脉后锯齿形，亚端线微白，内侧衬黑色，不规则锯齿形，翅外缘有一列黑点，顶角后、中段及臀角各有一白斑纹，缘毛紫灰色杂黑褐色；后翅赭白色带褐色，端线褐色，缘毛赭白色，中有一褐线。

**分布** 浙江、湖南；俄罗斯。

### 白斑瑙夜蛾 *Maliattha melaleuca* (Hampson) (图版 XLI-31)

*Lithacodia melaleuca* Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 508. pl. 164, fig. 3.  
(舟山群岛)

*Maliattha melaleuca*: Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 3: 277, pl. 52b.

*Lithacodia melaleuca*: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 136.

翅展 24—26mm。头部与胸部黑褐色带铅灰色，下胸与足黑褐杂灰色，跗节外侧各节间有白斑；前翅黑褐色带铅灰色，部分带铜色，基线仅在前缘区现一褐纹，内线黑色，内侧有少许褐色，波浪形后行，环纹圆形，肾纹内外缘中凹，两纹均有不完整的黑边，肾纹前有一白色三角形斑，外线双线黑色，外弯，后段外侧有一白斑，前缘脉近端部有 2 白点，亚端线黑色，锯齿形，在中褶与亚中褶处内弯，翅外缘有一列新月形黑纹；后翅黑褐色带有铜色感，翅外缘有一列黑纹，缘毛中有一白线一黑线；腹部黑褐色杂少许白色，毛簇黑色。