

甘蓝夜蛾属 *Mamestra* Ochsenheimer

Mamestra Ochsenheimer, 1816, Schmett. Eur. 4: 76.

Type-species: *Phalaena brassicae* Linnaeus.

Barathra Hübner, [1821] 1816, Verz. Bek. Schmett. p. 218.

Mamistra Sodoffsky, 1837, Bull. Soc. Natur. Mosc. 10 (6): 87.

Copimamestra Grote, 1883, Ann. Mag. nat. Hist. 5 (11): 54.

喙发达，下唇须斜向上伸，第一、二节下缘有毛，第三节短，额平滑，复眼大而圆，无纤毛，雄蛾触角上有微细的纤毛；前后胸有分散的毛簇，前足胫节比跗节短，外缘有刺，各足胫节都有毛；腹部各节有一列毛簇，第一腹节的毛簇较大；前翅外缘弯曲。

甘蓝夜蛾 *Mamestra brassicae* (Linnaeus) (图版 XVII-4)

Phalaena Noctua brassicae Linnaeus, 1758, Syst. Nat. (Edn 10) 1: 516. (欧洲)

Barathra brassicae: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 67. ——Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.962.

翅展 40—50mm。头、胸暗褐杂灰色；前翅褐色，中褶、亚中褶及后缘区基部带赤褐色，翅基部有端白的黑褐鳞丛，基线、内线均双线黑色，中线模糊，外线黑色锯齿形，亚端线黄白色，在 3、4 脉处锯齿形，剑纹短，环纹浅褐色，肾纹白色有黑环，后半有一黑褐小斑；后翅浅褐色，2 脉近端部一白纹；腹部灰褐色。

寄主 甘蓝及多种蔬菜；甘蔗、高粱、棉、桑、麦类。

分布 黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、华北、湖北、四川、西藏；日本，俄罗斯，印度，欧洲。

歧夜蛾属 *Discestra* Hampson

Discestra Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 15.

Type-species: *Mamestra chartaria* Grote.

Salacia Boie, 1839, Zeit. ent. 1: 391.

喙发达，下唇须斜向上伸，第三节平伸，额突起呈球面形，微有纵脊，下有角质片，复眼大，圆形，雄蛾触角线形；头、胸饰毛和鳞，前、后胸有散开形毛簇；腹部背面有一列毛簇；前翅有副室。雄蛾抱器瓣左右两部常不对称。

种 检 索 表

1. 前翅 2 脉基部有齿纹 矢歧夜蛾 *Discestra armata*