

翅展 52 mm。全体白色，额黑色，颈板与翅基片大部黄色，后者及后胸有黑点，前翅中室后一黄条似棒状，前方一列银蓝斑纹，翅外半的前部有窄长银蓝纹，黑边，顶角有双斜纹，外区外方一浅褐梨形大斑，中有四个小白斑，斑的外 1/3 红色，中室外一黑纵纹，梨形斑外伸三条黑斜纹，后端一黑边银蓝纹，其内侧另一同色纹，亚中褶中段有二小黑斑。雄蛾抱器瓣较窄长，抱钩近瓣腹缘(图 650)。

分布 海南；印度，锡金。




图 650 象形文夜蛾 *Baorisa hieroglyphica*
Moore ♂ 外生殖器 (仿 Holloway)

长吻夜蛾属 *Marapana* Moore

Marapana Moore, [1885], 1887, Lep. Ceyl. 3: 227.

Type-species: *Hypena raralis* Walker.

喙发达，下唇须第二节极长，向前平伸，第三节斜向上伸，触角线形，有纤毛；前翅顶角尖，8、9脉并接，有一副室；后翅臀角斜削，3、4脉短共柄，5脉发达，自中室横脉中部稍后发出。

长吻夜蛾 *Marapana pulverata* Guenée (图版 LX-16)

Sanys pulverata Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 351. (印度)

Hypena raralis Walker, [1859] 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 65.

Hypena truncatalis Walker, [1866] 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 34: 1513.

Marapana bilineata Bethune-Baker, 1908, Nov. zool. 15: 226.

Marapana pulverata: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind, 3: 72. —Holloway, 1976, Moths Borneo p. 38. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 386.

翅展 35 mm。头部砖红色，下唇须黑色，长，向前平伸，第一、二节外侧褐黑色，第二节背缘饰褐黑鳞，腹缘灰色，第三节下缘内半饰灰黑色鳞似呈三角形，端部尖，灰色；胸部背面砖红色，足细长，浅灰




图 651 长吻夜蛾 *Marapana pulverata*
Guenée ♂ 外生殖器

色;前翅砖红色,环纹只现一黑色圆点,中室下角有一小黑点,外线棕色,自前缘脉直线内斜至翅后缘,亚端线由一系列暗褐色齿形点组成,翅外缘有一列黑色圆形点,缘毛紫红色;后翅砖红色,外线棕色,由前缘区后直线内斜至翅后缘,亚端线由一系列暗褐色齿形点组成,翅外缘有一列黑色圆形点,端线褐黄色,缘毛紫红色;腹部砖红色。雄蛾钩形突较粗,端部尖,抱器瓣长而宽,背、腹缘近端部微凹,端缘斜,背角钝,抱钩细长(图 651)。

分布 广东;印度,缅甸,斯里兰卡,印度尼西亚。

元夜蛾属 *Avitta* Walker

Avitta Walker, 1858, List. Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1674.

Type-species: *Avitta subsignana* Walker.

Asta Walker, [1863] 1864, J. Proc. Linn. Soc., zool. 7: 170.

Oroba Walker, [1863], J. Proc. Linn. Soc., zool. 7: 81.

Pantura Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 247.

Imleanga Lucas, 1901, Proc. R. Soc. Qd. 16: 83.

喙发达,下唇须向上伸,镰刀形,第二节达头顶,第三节长,雄蛾触角锯齿形,胸部与腹部被平滑鳞片,中、后足胫节外缘饰毛,前翅有一狭长副室,后翅 5 脉发达,自中室下角发出。

种 检 索 表

1. 前翅有亚顶斑 黑点元夜蛾 *Avitta puncta*
- 前翅无亚顶斑 2
2. 前翅各横线直斜 四线元夜蛾 *A. quadralinea*
- 前翅横线波曲 岛元夜蛾 *A. ophiusalis*

黑点元夜蛾 *Avitta puncta* Wileman (图版 LX-21)

Avitta puncta Wileman, 1911, Trans. ent. Soc. p. 251, pl. 50, fig. 21. (日本)

Avitta puncta: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 441. —Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. Jap. p. 177. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 368. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 871.

翅展 41 mm。头部褐色,额有向前突的毛簇,下唇须第三节细长;胸部背面褐色,颈板基半部有一黑色横纹,足跗节各节间有褐黄斑;前翅棕褐色,前后缘亚平行,内线黑色,细波浪形,中段稍内弯,环纹只现一黑点,肾纹只现一较粗的黑褐点,中线黑色,细波浪形,在中室处不显,外线黑色,细波浪形,自前缘脉后外斜,至 7 脉处折角内斜,在亚中褶处稍内弯,亚端线双线黑色,细波浪形,两线相距较宽,外一线在 7 脉