

白曲纹，后端黑色，外线由白点列成一前端的点大，其后列成锯齿形，内侧衬黑色，亚端线白色锯齿形；后翅烟褐色；腹部暗褐灰色。

分布 陕西、江苏、浙江、湖南、云南。

雍夜蛾 *Oederemia lithoplasta* Hampson (图版 XXXII-2)

Oederemia lithoplasta Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 406, text fig. 65. (乌兹别克)

Oederemia lithoplasta: Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.49.

翅展 34mm。头、胸白色带褐色；前翅白色带黄褐色，布有细黑点，基线与内线黑色波浪形，后者内侧衬白，剑纹端缘黑色，环、肾纹白色，中线黑色锯齿形，外线双线黑色，外一线间断为点列，亚端线白色锯齿形，内侧有黑纹，翅外缘一系列黑点；后翅白色带污褐色，外线细，亚端线为带状，两线均褐色；腹部白色带褐色。

分布 西藏；中亚地区。

小雍夜蛾 *Oederemia nanata* Draudt (图版 XXXII-3)

Oederemia nanata Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 18, pl. 3, fig. 10. (云南德钦、丽江)

翅展 27mm。头、胸及前翅黑褐色，前翅基线黑色锯齿形，外侧衬灰色，内线黑色，外侧衬灰色，自前缘脉后外弯，环纹大，斜椭圆形，淡褐色，中有褐圈，肾纹大，色似环纹，外线黑色，微锯齿形，外衬灰色，自前缘脉后外弯至 2 脉后垂向翅后缘，内线与外线之间的亚中褶色暗并有黑色纹，外区前缘脉上有一列灰黄斜纹，外线后端外侧至臀角有一灰黄色椭圆形斑，界限不明晰，亚端线灰黄色，锯齿形，有间断，端线由一系列新月形黑点组成，缘毛基部灰黄色；后翅灰褐色，端区色暗，横脉纹黑褐色；腹部灰色，布有黑点。

分布 福建、云南。

宝夜蛾属 *Margelana* Staudinger

Margelana Staudinger, 1888, Stett. ent. Zeit. 49: 20.

Type-species: *Margelana versicolor* Staudinger.

喙不发达，下唇须向前伸，第三节小，额平滑，复眼大，雄蛾触角双栉形或锯齿形；胸部被毛和毛状鳞，前、后胸有散开的毛簇；腹部背面无毛簇；前翅有副室。

宝夜蛾 *Margelana versicolor* Staudinger (图版 XXXII-4)

Margelana versicolor Staudinger, 1888, Stett. ent. Zeit. p. 20. (乌兹别克)

Margelana versicolor: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 449. —Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 181. —Draudt, 1934, ibid. Suppl. p. 164. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 32.

体长 14mm 左右；翅展 30mm 左右。头部与胸部淡黄褐色杂灰色，头顶、颈板及翅基片前缘杂有黑色，雄蛾触角双栉状，栉齿长；前翅淡褐黄色，除前缘区外均布有暗褐细点，翅脉黄白色，内线粗，黄白色，自中室外斜至亚中褶，然后锯齿形折向内斜，1 脉后的齿小，环纹小，黄白色，斜圆形，外端稍尖，肾纹窄曲，后端微内突，黄白色，外线黄白色，粗，自前缘脉外伸至顶角，然后微波曲内斜，外侧衬暗褐色，亚端线黄白色，不清晰，端线黑色，缘毛黄白色，端部杂以暗褐色；后翅黄白色带褐色，外区色暗，缘毛黄白色；腹部浅赭黄色。

分布 新疆；中亚地区。

缓夜蛾属 *Eremobia* Stephens

Eremobia Stephens, 1829, Nom. Brit. Ins. p. 42.

Type-species: *Noctua ochroleuca* [Denis et Schiffermüller].

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达额中部，前方有毛，第三节短，额平滑，复眼圆大，雄蛾触角一般锯齿形，有纤毛，头部及胸部具粗毛及毛状鳞；前、后胸有散开的毛簇，胫节饰毛中长；腹部基部几节有毛簇；前翅三角形，顶角圆钝，外缘曲度平稳，有副室；后翅 6、7 脉合一短柄。

种 检 索 表

前翅微绿，环纹小 狄缓夜蛾 *Eremobia deccerti*
前翅灰褐，环纹窄斜 白线缓夜蛾 *E. decipiens*

白线缓夜蛾 *Eremobia decipiens* (Alpheraky) (图版 XXXII-5)

Hadena decipiens Alpheraky, 1895, Iris, 8: 193. (蒙古)

Eremobia decipiens: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 412. —Chen, 1982, Icon. Her. Sin. 3: 262.

翅展 41—44mm。头部黑褐色；胸部褐色杂白色；前翅灰褐色，基部有鳞片丛，其端部白色，基线，内线，外线及亚端线白色，内线及外线锯齿形，环纹窄斜，白边，剑纹较长，白边，肾纹窄长，内外缘白色，翅外缘一系列新月形黑点；后翅浅褐色，外线、亚端线暗褐色，后者粗，外侧衬白色；腹部褐色，节间微白。

分布 黑龙江、新疆；蒙古。