

喉斑形式变化亦多，根据个别皮张的色泽变化难以判定，西藏石貂的这两个亚种应予合并。

但 Hodgson 得到的标本未能符合 15 届国际动物学会规定的“命名法规”12 条进行记载，其记叙应作无效，西藏石貂学名应为 *kozlovi*。

亚种

(1) 北方亚种 *Mustela foina intermedia* Severtzov

- 1873 *Mustela intermedia* Severtzov, Men. Soc. Amis. Sci. Nat. Moscow, 8, 2:61. 1876, Ann. Mag. N. H. 18:45(模式产地：苏联中亚地区的 Chu, Tallas 及 Naryn 盆地)。
 1914 *Martes foina altaica* Satunin, Conspectus Mann. Ross. I:III (模式产地：阿尔泰)。
 1938 *Martes foina foina*, Allen, The mammals of China and Mongolia. I:367—368。

分布于新疆阿尔泰、莎车、和靖、焉耆、和硕、库尔勒、拜城、且末、若羌，甘肃省武威，陕西省定边、靖边、吴旗、横山、神木，山西省雁北、忻县、安泽、临猗，河北省唐县，青海省北部，宁夏、内蒙古及辽宁西部等。

体背毛色灰褐色，针毛较稀疏。头颈部及四肢绒毛浅灰，头顶部、面颊及两耳背为淡褐，针毛皆短。耳边缘污白，背部针毛棕褐色，在背中线聚集，最长可达 55 毫米，呈深棕褐色，喉斑呈“V”形或不规则形，一般为白色。四肢及尾暗褐，脚趾被毛，掌、趾垫裸露。陕西的标本亦有浅灰色型，内蒙古的标本呈淡黄褐色型。夏皮色泽显灰，底绒沾黄，喉斑淡黄色。

量衡度：

外形 (衡：克；度：毫米)

标本号	性别	采集时间	体重	体长	尾长	后足长	耳长	产地
73052	♂(亚成体)	73.7	800	340	230	45	18	陕西吴旗
—	♂	—	1550	432	264.7	96.4	—	陕西定边
73046	—	73.12	—	460	260	78	22	陕西定边
73047	—	73.12	—	480	260	75	20	陕西定边
73048	—	73.12	—	450	240	68	18	陕西定边
750074	—	75.9	—	480	270	78	21	陕西定边

头骨 (毫米)

标本号	性别	采集时间	颅全长	基长	颤长	颤宽	眶间宽	后头宽	听泡长	听泡宽	上齿列长	下齿列长	上裂齿	第一上臼齿	产地
73052	♂(亚成体)	73.7	75.2	71.5	37.8	43.6	18.6	25.2	14.2	12.6	26.6	33.2	—	—	陕西吴旗
—	♂	—	86.7	83.9	—	48.2	24.9	38.1	15.1	12.3	29.1	35.4	—	—	陕西定边
75005	—	75.12	79.3	74.1	39.3	48.8	20.4	35.4	15	12.8	31.5	33.4	8.8	8.0	陕西定边
75007	—	75.12	82.1	75.9	42.0	48.1	20.1	36.9	15.3	12.8	29.1	34.6	9.2	8.0	陕西吴旗
75006	—	75.12	89.9	81.8	45.5	51.5	20.4	37.6	15.8	13.4	30.5	36.2	10	9.5	陕西吴旗
01109	—	76.1	81.3	74.2	40.5	51.8	20.6	38.3	15.3	12.4	30.2	34.8	9.6	8.8	新疆青河

intermedia 与欧洲的 *foina* 在毛色上主要区别是后者色型变化较多, 诸如: “赤红色、巧克力褐色、淡赭褐色、黄褐色、淡褐色”, 后者仅灰、浅灰色型, 除此以外, 齿型上的区别是 *intermedia* 的第三上前臼齿外缘后角微微弯出, 其外缘中部并不凸出, 而 *foina* 则是明显的双凸形。同时 *intermedia* 的第一上臼齿小于裂齿的长度, 而 *foina* 的第一上臼齿大于裂齿。

由于 *intermedia* 齿型特征与松貂 (*M. martes*) 某些特征相似, Miller 研究北方亚种的特征后称为“*intermedia* (中间型)”。

(2) 青藏亚种 *Martes foina kozlovi* Ognev

1931 *Martes foina kozlovi* Ognev, Звери СССР и Прилежащих Стран, АН СССР, Москва. II: 631. (模式产地: 西藏澜沧江上游昌都)。

分布于西藏拉萨、昌都, 青海玉树(杂多), 云南迪庆及四川西部。

体背毛色淡棕褐色, 喉部白斑发达, 由下唇、前胸延伸到肩胛, 一般为长方形, 但有的白斑中央有两个淡褐色小斑, 尾近 $1/3$ 处毛色与背部相同, 其余部分为棕褐色, 四肢与尾同色。在前肢内侧各具白色小斑, 腹部中央为污白色绒毛。云南的夏皮标本喉斑为茧黄色。

量衡度:

外形 (毫米)

体长	尾长	后足长	耳长	产地
460	310	80	20	西藏昌都
460	330	82	21	西藏昌都

头骨 (毫米)

颅全长	基长	颤长	颧宽	眶间宽	后头宽	听泡长	听泡宽	上齿列长	下齿列长	上裂齿	第一上臼齿
83.3	73.1	39.5	51.8	21.5	34.2	15.3	11.2	30.1	34.6	8.4	7.7
81.2	74.0	39.4	47.2	19.5	34.2	14.6	11.6	30.8	35.0	8.9	8.2

本亚种特征是齿型纤细, 第三上前臼齿外缘有一个向内前方倾斜的缺口, 第四上前臼齿齿根窄小, 从我国昌都得到的标本, 包括皮张及头骨特征均与 *kozlovi* 相符。

13. 紫貂 *Martes zibellina* Linnaeus (图版三, 图 2)

1758 *Mustela zibellina* Linnaeus, Syst. Nat. 10th ed. 1: 46 (模式产地: 西伯利亚)。

别名: 貂、貂鼠、赤貂、黑貂、大叶子(吉林)、松狗(本草纲目)、巴勒格(鄂伦春族、达斡尔族)、安德烈卡克(鄂温克族)、顿·扎塞顿(朝鲜族)、什阿布(赫哲族)、布鲁贡(维吾尔族), 布鲁昆(哈萨克族), 大皮(东北)。

鉴别特征 体躯细长, 四肢短健如中型家猫。体色单一, 为灰褐、黄褐或黑褐色。喉