

白齿薄夜蛾 *Mecodina albodentata* (Swinhoe) (图版 LXIV-15)

Oglasa albodentata Swinhoe, 1895, Ann. Mag. nat. Hist. 6, 15: 13. (印度)

Mecodina albodentata: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 5. ——Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 873, pl. 217, figs. 19—20.

翅展 44 mm。头部与胸部暗灰褐色；前翅灰褐色微带紫色，内线深棕色，细波浪形外斜，在亚中褶折角内斜，环纹只现一黑棕点，肾纹极窄，褐黄色，内侧衬黑褐色，中线黑棕色，微波曲，自前缘脉外斜至中室下角折向内斜，外线细弱，黑棕色，微波浪形，外弯，外区前部有一黑棕色斑，约呈斗形，其后有一黑纹斜至翅外缘，亚端线隐约可见几个黑棕色齿形纹，翅外缘有一列黑棕色新月形纹；后翅灰褐色，中线仅在中室后可见，黑棕色，外线黑棕色，锯齿形，亚端线粗，黑棕色，在 5 脉前不明显，5 脉后锯齿形，外侧衬浅褐色；腹部灰褐色。

分布 海南、西藏；日本，锡金，印度。

缘斑薄夜蛾 *Mecodina costimacula* Leech (图版 LXIV-16)

Mecodina costimacula Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 594. (中国西部: Chia-kou-ho)

Araeognatha costimacula: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 403. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 376.

翅展 30 mm。头部与胸部褐黄色杂深棕色，足跗节外侧黑褐色，各节间有浅褐黄色斑；前翅褐黄色，密布黑色细点，基线黑色，自前缘脉至中室后缘，内线黄色，自前缘脉外斜至中室弯曲内斜，外侧有一斜三角形黑斑位于中室前，环纹小，黑色黄边，近圆形，肾纹“S”形，黑色黄边，前方有一不清晰的斗形黑斑，外线黄色，内侧衬黑色，自前缘脉波浪形外斜至 6 脉折向内弯，亚端线黄色，不规则波浪形，在 3、4 脉处外凸明显，其后内斜，内侧有一近半月形大黑斑，位于前缘脉与 7 脉间，外侧近顶角有一小黑斑，线中、后部内侧衬黑色，端线由一列三角形黑点组成；后翅褐黄色，密布黑色细点，端区色较暗，外线黄色，内侧衬黑色，自前缘后较直内斜，亚端线黄色，内侧衬黑色，细波浪形，中段外弯，端线黑色；腹部灰黄色，密布黑点。

分布 海南、四川、云南。

紫灰薄夜蛾 *Mecodina subviolacea* (Butler) (图版 LXIV-17)

Saraca subviolacea Butler, 1881, Trans. ent. Soc. p. 581. (日本横滨)

Tryridospila virgata Swinhoe, 1889, Proc. zool. Soc. p. 415.

Araeognatha subviolacea: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 404. ——Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 169. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 376. ——Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 1030.