

色，自前缘脉至中室后缘，其外侧有一黄色点位于中室，内线暗褐色，自前缘脉外弯，至亚中褶处内弯，前端内侧有一黄纹，环纹只现一黑点，中线暗褐色，微波浪形，在前缘区粗壮，似一小暗褐斑，在中室后缘稍外凸，肾纹窄，灰色褐边，外线褐色，锯齿形，自前缘脉后外弯，在中褶处稍内凸，4脉后内斜，在亚中褶处明显内凸，前端两侧有黄纹，亚端线前段白色，其后为各翅脉上的白色尖点，约列成锯齿形，前段内侧有一黑棕色三角形大斑；后翅褐灰色带紫色，内线与中线褐色，细波浪形，亚端区有一黑棕色粗线，在前缘区折曲，其后直线内斜，线内侧衬暗黄色，外侧衬灰色，端线黑棕色，波浪形；腹部紫褐灰色。

分布 河北、河南、浙江、湖北、福建、广西；日本，朝鲜。

云薄夜蛾 *Mecodina nubiferalis* (Leech) (图版 LXIV-22)

Platyja nubiferalis Leech, 1889, Entom. 22: 64, pl. 2, fig. 8. (日本)

Araeognatha nubiferalis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 404.

Mecodina nubiferalis. Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 595. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1. 872.

翅展 36 mm。头部与胸部褐色；前翅褐色，斑纹及横线均不明显，基线深褐色，自前缘脉外弯至中室，外侧微衬白色，内线棕色，在前缘区为较粗外斜纹，其后微弱，波浪形，在1脉处成一内凸齿，内外侧的前缘脉浅黄色，中线棕色，在前缘区为一近三角形斑，其后细弱，在中褶处内凸，外线棕色，在前缘区较粗，波浪形外弯，4脉后内弯，前半外侧带有白色，在前缘区白色明显，亚端线隐约可辨，灰白色，不规则锯齿形，自近顶角波曲内斜，中褶处内弯，4脉后断为点列，内侧均衬暗褐色，6脉前的外线与亚端线间深褐色，似成一半圆形大斑，亚端前端外侧有一白点；后翅褐色，基部色浅，前缘区浅黄色，外区有一内弯的深褐色弧形窄带，自6脉至臀角，外侧衬浅紫灰色；腹部灰褐色，腹面黄色。

分布 河北；日本。

洒夜蛾属 *Psimada* Walker

Psimada Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1827.

Type-species: *Psimada quadripennis* Walker.

喙发达，下唇须斜向上伸，第三节短而钝，向前伸，复眼圆大，雄蛾触角有纤毛，中部厚，上缘有鳞脊；前、后翅外缘中部外凸。

洒夜蛾 *Psimada quadripennis* Walker (图版 LXIV-23)

Psimada quadripennis Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1828. (印度)