

簇，基线白色波浪形，内线不明显，剑纹赤褐边，环、肾纹灰色，前者小而斜，外线黑褐色锯齿形，外侧衬黄白色，亚端线白色，在3、4脉处锯齿形；后翅黄白微带褐色；腹部灰黄带褐色。雄蛾抱器瓣端窄，成一长柄冠，内突二叉（图352）。

寄主 甘蓝、苎麻、榆、酸模属等。

分布 内蒙古、新疆；中亚地区，欧洲。

乌夜蛾属 *Melanchra* Hübner

Melanchra Hübner, [1820] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 207.

Type-species: *Phalaena persicariae* Linnaeus.

Ceramica Guenée, 1852, in Boisduval & Guenée, Hist. Natur. Ins. Lep. p. 343.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节前缘有长毛，第三节短，额平滑，复眼大而圆。头部和胸部主要是鳞片，前胸及后胸上有毛簇，胫节有长毛，腹部背面有一列毛簇。

乌夜蛾 *Melanchra persicariae* (Linnaeus) (图版XVIII-30)

Phalaena Noctua persicariae Linnaeus, 1761, Fn. Suec. p. 319. (瑞典)

Polia persicariae: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 105. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 298.

Melanchra persicariae: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 702.

翅展40mm。头、胸黑色；前翅黑色带褐，基线、内线均双线黑色，波浪形，环纹黑边，肾纹明显白色，中央有一褐曲纹，中线黑色，外线双线黑色锯齿形，亚端线灰白色，内侧有一列黑色锯齿形纹，端线为一列黑点；后翅白色，翅脉及端区黑褐色，亚端线淡黄色，仅后半明显；腹部褐色。

寄主 多食性，取食多种低矮草本植物，但秋季也为害柳、桦、楸等木本植物。

分布 黑龙江、内蒙古、河北、山西、山东、河南、四川、云南；日本，欧洲。

矢夜蛾属 *Odontestra* Hampson

Odontestra Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 205.

Type-species: *Mamestra vittigera* Hampson.

喙发达，下唇须短，斜伸，前缘有毛，额具圆形突起，下有角质片，复眼圆大，雄蛾触角线形，有纤毛；头部及胸部主要是鳞片，前、后胸有散开的毛簇；腹部第一节背面有毛簇；前翅稍短宽，外缘曲度平稳，有副室。

种 检 索 表

1. 前翅亚端线白色，细 2