

褐色，翅中部的三条线和中点深灰色，各线外侧伴有一条灰白色线；翅端部略带黑褐色，有极细弱的亚缘线。翅反面浅灰褐至灰褐色，中点黑灰色；前后翅外线深灰褐色，清晰完整，深波状，其内侧有两条较弱的波线，在前翅前缘处均增粗成黑灰色斑；前翅端部宽带在反面较模糊，黑灰色掺杂黄褐色，亚缘线为一列细小白点，无蓝灰色斑。

雄性外生殖器（图 1189）：阳茎基环侧突较前种略短。囊形突半圆形。抱器腹端突略细。阳茎较前种短粗，近端部处侧面有一骨刺。

雌性外生殖器（图 1193）：囊导管远较前种短，上半段完全骨化，下端膜质。囊颈处凹陷，囊体肥大，囊片粗且长，两端尖。

检视标本：1 ♂，福建南平，1981. V. 10；1 ♂ 3 ♀，福建武夷山，1982. IV. 24, IX. 12、16。

分布：台湾、福建；日本（琉球群岛）。

格链亚种 *subsp. clathrata* (Warren) (图版 XXV: 6)

Cidaria (?) *clathrata* Warren. (印度: Khasis)

Melanthia procellata clathrata: Prout, 1939, in Seitz, Macrolepid. World 12: 291, pl. 28: 1.

Melanthia catenaria clathrata: Inoue, 1971, Bull. Fac. domestic Sci., Otsuma Woman's Univ. 7: 164.

前翅长：♂ 16—17 mm。体型略小。前翅中域弥漫灰褐色，具密集网格状波纹；端带内缘向内扩展，与中域大斑接触，其中亚缘线的浅色斑弱小或近于消失；后翅灰褐色，基半部明显较中链亚种色深，线纹模糊。翅反面近似中链亚种。

检视标本：1 ♂，广西武鸣，1 200 m，1984. IV. 2；1 ♂，四川峨眉山，800—1 000 m，1957. IX. 20。

分布：广西、四川；印度。

平纹黑岛尺蛾 *Melanthia postalbaria* (Leech, 1897) (图版 XXV: 7)

Cidaria postalbaria Leech, 1897, Ann. Mag. nat. Hist. (6) 19: 645. (四川: Pu-tsu-fong)

Cidaria (*Melanthia*) *postalbaria*: Prout, 1914, in Seitz, Macrolepid. World 4: 254, pl. 13: n.

Melanthia postalbaria: Prout, 1939, ibidem 12: 291.

前翅长：♂ 16 mm，♀ 18 mm。头和胸部背面黑褐色，腹部背面色较浅。前翅黑褐色，亚基线与中线之间和外线外侧色稍浅；亚基线和外线外侧及中线内侧有细弱浅色边；亚基线浅弧形微波曲；中线在中室内向外弯曲，但不形成尖角；外线略波曲，中部无明显外凸；亚缘线在 M_3 下方和臀褶处各有一个鲜明的小白斑，前者较大，其它白点极细小或消失；无缘线，缘毛深灰褐色。后翅白色，后缘附近散布灰褐色，中点黑灰色清晰；缘线黑褐色不完整，缘毛白色与深灰褐色掺杂。前翅反面浅灰褐至灰褐色，外线