

## 外形 (毫米)

| 性 别 | 体 长   | 尾 长   | 后 足 长 | 颅 全 长 |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| ♂   | 609.6 | 203.2 | 114.8 | 122.0 |
| ♀   | 665.8 | 177.8 | 95.3  | 127.0 |

(2) 东北亚种 *Meles meles amurensis* Schrenck

1859 *Meles taxus amurensis* Schrenck, Reisen Amur-Lande, 17, pl. I. fig. I (模式产地: 乌苏里河口附近)。

分布于黑龙江的伊春、密山、林口、吉文, 吉林的敦化、靖宇、抚松、辉南、安图, 辽宁的章古台和安东。

本亚种比国内其它亚种颜面部白色纵纹短, 背部针毛毛尖淡黄而非纯白, 头部中央白色纵纹短而宽, 延伸近眼部。体形小, 尾短。通体色调趋于褐色, 头部色调浅褐色占优势。

量衡度:

## 外形 (衡: 克; 度: 毫米)

| 标本号   | 性 别 | 体 重  | 体 长 | 尾 长 | 后 足 长 | 耳 长 |
|-------|-----|------|-----|-----|-------|-----|
| 08246 | ♂   | 4820 | 520 | 150 | 87    | 42  |
| 78411 | ♂   | 7500 | 520 | 170 | 90    | 42  |
| 08249 | ♂   | 3520 | 520 | 178 | 94    | 39  |
| 01066 | ♀   | 5800 | 615 | 192 | 95    | 46  |
| 01088 | ♀   | 3150 | 496 | 178 | 91    | 41  |
| 08113 | ♀   | 7100 | 616 | 165 | 100   | 45  |
| 08135 | ♀   | 7750 | 590 | 155 | 105   | 45  |
| 08250 | ♀   | 9000 | 600 | 155 | 100   | 45  |
| 08101 | ♀   | 3700 | 520 | 165 | 105   | 35  |

## 头 骨 (毫米)

| 标本号   | 性别 | 颅全长   | 基长    | 腭长   | 颧宽   | 眶间宽  | 后头宽  | 上齿列长 | 下齿列长 |
|-------|----|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 09657 | ♂  | 118.2 | 102.4 | 60.5 | 64.1 | 25.1 | 58.9 | 46.8 | 48.1 |
| 08139 | ♀  | 116.2 | 98.3  | 58.0 | 61.5 | 24.1 | 55.7 | 45.3 | 47.1 |
| 09474 | ♀  | 114.7 | 95.6  | 55.2 | 68.9 | 25.5 | 57.9 | 41.5 | 44.1 |
| 09656 | ♀  | 122.9 | 103.5 | 61.3 | 67.3 | 22.1 | 56.1 | 48.0 | 44.1 |
| 08101 | ♀  | 121.8 | 102.4 | 60.7 | 64.3 | 26.6 | 56.6 | 52.0 | 51.7 |
| 09455 | ♀  | 119.3 | 99.2  | 59.9 | 59.0 | 23.5 | 55.5 | 51.4 | 51.4 |

(3) 北方亚种 *Meles meles leptorhynchus* Milne-Edwards

1867 *Meles leptorhynchus* Milne-Edwards, Ann. Sci. Nat. Zool. 8: 374 (模式产地: 北京)。

1907 *Meles hanensis* Matschie, Wiss. Ergebn. Exped. Filchner to China, 10, 1: 138.