

头骨 (毫米)

标本号	性别	颅全长	基长	腭长	颧宽	眶间宽	后头宽	上齿列长	下齿列长
77-02	♂	137.3	125.9	66.6	78.9	27.3	65.3	42.4	50.4

在布尔津和尼勒克采得的标本体形大于国内其它亚种。从毛色看，体色较暗，通体色调趋于黑色，针毛白毛尖短，头部中央白色纵纹只达耳前，头骨粗宽，鼻骨平直而宽大，听泡卵圆形与其它亚种的三角形听泡截然相区别。

(6) 南疆亚种 *Meles meles blanfordi* Matschie

1907 *Meles blanfordi* Matschie, Wiss. Ergebni. Filchner Exped. to China. 10, 1: 143 (模式产地：新疆喀什)。

分布于南疆喀什、叶城等地。

体形中等。体背白色与黑褐色相混杂，针毛基部和毛尖白色、中段黑褐色环短，体侧色调比体背更浅，头部3条白色纵纹短而宽，中央白色纵纹超过眼睛延至耳后，头部色调趋于白色。

量衡度：

外形 (毫米)

性 别	体 长	尾 长	后足长	耳 长	产 地
♂	689	181	102	47	新疆叶城

XVI. 猪獾属 *Arctonyx* F. Cuvier

1825 *Arctonyx* F. Cuvier, H. N. Mamm. 3, pt. 51, pl. and text (模式种：*Arctonyx collaris* Cuvier.)。

参阅：Allen, 1938, 403—408; Lönnberg, 1923, 322—326; 张荣祖, 1958, 24(2) 158—173; 彭鸿绶等, 1962, 105—132; 高耀亭等, 1962, 14(2) 180—196; 汪松等, 1962, 24(4) 555—568; 陆长坤等, 1965, (2) 4 279—295; 寿振黄, 1962, 366—368。

形态 体形及大小与狗獾相似，但鼻吻部狭长而圆，酷似猪鼻。与狗獾不同之处，主要在于喉下具白色斑块，鼻垫与上唇间裸露不被毛，尾白色。头骨的颅前区稍向前下方倾斜，腭骨两侧缘略膨胀，呈长圆形瓣泡，中线部位略凹陷，钩状突宽而平直，向后延伸直达关节窝水平处。上臼齿近似菱形。

地理分布 本属在我国主要分布于华东、中南、西南、西北、华北、东北及西藏等地。国外，据报道主要见于印度，老挝，泰国，巴基斯坦，阿富汗，不丹，马来西亚及苏门答腊等地。

分类 我国自古已对该种动物定名为“獾”。(本草纲目)。早期，有人主张依据头骨和体形大小等特征划为两种：(1) 大形种 *A. collaris*, (2) 小形种 *A. taxoides*。近期的