

- 1907 *Meles siningensis* Matschie, loc, cit.
1907 *Meles tsingauensis* Matschie, loc, cit. 142.
1901 *Meles amurensis raddri* Kastschenko, Ann. Mus. Zool. Acad. Sci. St. Petersburg. 6: 613.

本亚种广泛分布于长江流域以北和黄河流域。内蒙古的四子王旗，山西的阳曲、太原，陕西的榆林、黄龙、甘泉、镇安、延长、延安、宜川，青海的贵南、西宁，甘肃的庆阳，安徽的蚌埠和江苏的盐城、南通，山东济南、青岛。

体背白色与浅黑褐色相混杂，针毛基部和毛尖白色，中段浅褐色环短，体侧比体背色调浅，有的个体呈白色或苍白色，通体色调趋于白色，头部3条白色纵纹短而窄，中央白纹超过眼睛直达耳根，头部色调趋于白色。

量衡度：

外 形 （衡：克；度：毫米）

标本号	性 别	体 重	体 长	尾 长	后 足 长	耳 长	产 地
682	♂	4000	650	203	104	41	安徽蚌埠
64281	♂	6000	610	180	104	50	青海贵南
76008	♂	7500	670	194	107	45	陕西黄龙
76005	♂	6890	670	185	104	44	陕西黄龙
681	♀	4250	680	185	102	40	江苏盐城
64282	♀	5150	590	190	103	47	青海贵南
—	♀	5450	590	130	97	49	山西阳曲
76009	♀	6000	600	178	104	46	陕西甘泉

头 骨 （毫米）

标本号	性别	颅 全 长	基长	腭长	颧宽	眶间宽	后头宽	上齿列	下齿列	产地
682	♂	122.2	107.6	57.8	67.7	23.7	58.2	38.9	44.2	安徽蚌埠
76005	♂	121.8	108.0	60.8	67.3	22.8	57.8	37.0	43.2	陕西黄龙
76008	♂	118.0	102.6	59.2	67.1	22.7	57.6	36.1	42.9	陕西黄龙
76004	♂	124.0	105.5	66.3	70.4	23.7	58.1	39.8	46.9	陕西镇安
681	♀	125.3	108.0	61.1	69.8	24.8	58.6	41.6	47.5	江苏盐城
64284	♀	122.5	104.2	62.2	62.1	22.7	57.8	39.3	46.6	青海贵南
76009	♀	121.9	108.3	65.7	68.4	23.1	57.8	37.1	45.4	陕西甘泉

本亚种以北京附近标本而订立。Allen (1938) 指出实为 *M. m. leptorhynchus* 的同物异名。北方亚种的主要特征为体形较大，体背针毛白色毛尖长，绒毛丰厚，体侧针毛白色或苍白色，通体色调趋于白色。

(4) 华南亚种 *Meles meles chinensis* Gray

1868 *Meles chinensis* Gray, P. Z. S. 207 (模式产地：福建厦门)。

分布于广东连平、连阳，浙江宁波、宁海、建德、桐庐，江苏扬州、南京，福建厦门、福州、南平，江西波阳、临川，湖南岳阳，四川万县、松潘以及贵州，湖北和云南。

体形略小,体背褐色与白色相混杂,针毛基部与毛尖乳白色,但染黄色,中段褐色环占1/4,体侧浅棕色,通体色调趋于棕色。头部3条纵纹长而窄,中央白色纵纹超过耳根达颈背部,头部色调趋于棕色。

量衡度*:

外 形 (衡: 克;度: 毫米)

标本号	性 别	体 重	体 长	尾 长	后 足 长	耳 长	产 地
401	♂	9000	700	190	100	47	广东连阳
407	♂	5625	600	180	105	35	广东连平
427	♀	6000	585	130	85	38	广东连平

头 骨 (毫米)

标本号	性别	颅全长	基长	腭长	颧宽	眶间宽	后头宽	上齿列	下齿列	产 地
401	♂	118.4	107.5	64.3	72.5	23.0	61.8	38.3	46.4	广东连阳
407	♂	118.5	102.4	59.6	63.0	23.1	58.2	36.1	44.9	广东连平
1505d*	♂	125.8	110.3	66.3	—	—	63.5	38.0	46.2	福建
1505a*	♀	110.2	101.5	61.3	61.8	—	56.3	35.3	—	福建
19952*	♀	116.8	103.8	62.5	67.0	—	57	37.3	44.5	福建
84356*	♀	116.0	104.0	61.0	60.2	—	54.2	35.5	43.1	四川

* 数据均录自 Allen (1938)。

本亚种系 Gray (1868) 根据厦门的标本而订立,此后, Milne-Edwards (1867) 亦在厦门采得标本,针毛褐色环的深浅和绒毛的厚薄随季节而变化,不能作为区分亚种的依据。认为 *M. m. chinensis* 应是 *M. m. leptorynchus* 的同物异名。华南亚种的主要特征为体形较小、颅全长为北方亚种的96.5% (北方亚种为104.5%),体背针毛毛尖沾染黄色,绒毛短薄,色泽较暗,体侧呈沙棕色,通体色调趋于棕色。

(5) 北疆亚种 *Meles meles tianschanensis* Hoyningen-Huene

1910 *Meles tianschanensis* Hoyningen-Huene, Zur. Biol. Estlandisch. Dachses, 63 (模式产地: 新疆天山)。

分布于新疆天山以北的布尔津和尼勒克、阿尔泰、塔城、伊宁等地。

体形大,尾长。体背黑褐色与白色相混杂,体色比东北亚种浅,体侧浅褐色,针毛白色毛尖短,通体色调趋于黑色。头部3条白色纵纹较宽,中央白色纵纹只达眼前,头部色调黑褐色占优势。1977年8月在伊宁的尼勒克获得一只全身白色变异的獾,体侧有2条2.5毫米宽的棕色纵纹。

量衡度:

外 形 (衡: 克;度: 毫米)

标本号	性 别	体 重	体 长	尾 长	后 足 长	耳 长	产 地
77-02	♂	6850	748	190	111	49	新疆尼勒克
75-010	♀	—	685	187	110	44	新疆布尔津