

外形 (毫米)

性 别	体 长	尾 长	后 足 长	颅 全 长
♂	609.6	203.2	114.8	122.0
♀	665.8	177.8	95.3	127.0

(2) 东北亚种 *Meles meles amurensis* Schrenck

1859 *Meles taxus amurensis* Schrenck, Reisen Amur-Lande, 17, pl. I. fig. I (模式产地: 乌苏里河口附近)。

分布于黑龙江的伊春、密山、林口、吉文, 吉林的敦化、靖宇、抚松、辉南、安图, 辽宁的章古台和安东。

本亚种比国内其它亚种颜面部白色纵纹短, 背部针毛毛尖淡黄而非纯白, 头部中央白色纵纹短而宽, 延伸近眼部。体形小, 尾短。通体色调趋于褐色, 头部色调浅褐色占优势。

量衡度:

外形 (衡: 克; 度: 毫米)

标本号	性 别	体 重	体 长	尾 长	后 足 长	耳 长
08246	♂	4820	520	150	87	42
78411	♂	7500	520	170	90	42
08249	♂	3520	520	178	94	39
01066	♀	5800	615	192	95	46
01088	♀	3150	496	178	91	41
08113	♀	7100	616	165	100	45
08135	♀	7750	590	155	105	45
08250	♀	9000	600	155	100	45
08101	♀	3700	520	165	105	35

头 骨 (毫米)

标本号	性别	颅全长	基长	腭长	颧宽	眶间宽	后头宽	上齿列长	下齿列长
09657	♂	118.2	102.4	60.5	64.1	25.1	58.9	46.8	48.1
08139	♀	116.2	98.3	58.0	61.5	24.1	55.7	45.3	47.1
09474	♀	114.7	95.6	55.2	68.9	25.5	57.9	41.5	44.1
09656	♀	122.9	103.5	61.3	67.3	22.1	56.1	48.0	44.1
08101	♀	121.8	102.4	60.7	64.3	26.6	56.6	52.0	51.7
09455	♀	119.3	99.2	59.9	59.0	23.5	55.5	51.4	51.4

(3) 北方亚种 *Meles meles leptorhynchus* Milne-Edwards

1867 *Meles leptorhynchus* Milne-Edwards, Ann. Sci. Nat. Zool. 8: 374 (模式产地: 北京)。

1907 *Meles hanensis* Matschie, Wiss. Ergebn. Exped. Filchner to China, 10, 1: 138.

1907 *Meles siningensis* Matschie, loc. cit.

1907 *Meles tsingauensis* Matschie, loc. cit. 142.

1901 *Meles amurensis raddri* Kastschenko, Ann. Mus. Zool. Acad. Sci. St. Petersburg. 6: 613.

本亚种广泛分布于长江流域以北和黄河流域。内蒙古的四子王旗, 山西的阳曲、太原, 陕西的榆林、黄龙、甘泉、镇安、延长、延安、宜川, 青海的贵南、西宁, 甘肃的庆阳, 安徽的蚌埠和江苏的盐城、南通, 山东济南、青岛。

体背白色与浅黑褐色相混杂, 针毛基部和毛尖白色, 中段浅褐色环短, 体侧比体背色调浅, 有的个体呈白色或苍白色, 通体色调趋于白色, 头部 3 条白色纵纹短而窄, 中央白纹超过眼睛直达耳根, 头部色调趋于白色。

量衡度:

外形 (衡: 克; 度: 毫米)

标本号	性别	体重	体长	尾长	后足长	耳长	产地
682	♂	4000	650	203	104	41	安徽蚌埠
64281	♂	6000	610	180	104	50	青海贵南
76008	♂	7500	670	194	107	45	陕西黄龙
76005	♂	6890	670	185	104	44	陕西黄龙
681	♀	4250	680	185	102	40	江苏盐城
64282	♀	5150	590	190	103	47	青海贵南
—	♀	5450	590	130	97	49	山西阳曲
76009	♀	6000	600	178	104	46	陕西甘泉

头骨 (毫米)

标本号	性别	颅全长	基长	腭长	颞宽	眶间宽	后头宽	上齿列	下齿列	产地
682	♂	122.2	107.6	57.8	67.7	23.7	58.2	38.9	44.2	安徽蚌埠
76005	♂	121.8	108.0	60.8	67.3	22.8	57.8	37.0	43.2	陕西黄龙
76008	♂	118.0	102.6	59.2	67.1	22.7	57.6	36.1	42.9	陕西黄龙
76004	♂	124.0	105.5	66.3	70.4	23.7	58.1	39.8	46.9	陕西镇安
681	♀	125.3	108.0	61.1	69.8	24.8	58.6	41.6	47.5	江苏盐城
64284	♀	122.5	104.2	62.2	62.1	22.7	57.8	39.3	46.6	青海贵南
76009	♀	121.9	108.3	65.7	68.4	23.1	57.8	37.1	45.4	陕西甘泉

本亚种以北京附近标本而订立。Allen (1938) 指出实为 *M. m. leptorhynchus* 的同物异名。北方亚种的主要特征为体形较大, 体背针毛白色毛尖长, 绒毛丰厚, 体侧针毛白色或苍白色, 通体色调趋于白色。

(4) 华南亚种 *Meles meles chinensis* Gray

1868 *Meles chinensis* Gray, P. Z. S. 207 (模式产地: 福建厦门)。

分布于广东连平、连阳, 浙江宁波、宁海、建德、桐庐, 江苏扬州、南京, 福建厦门、福州、南平, 江西波阳、临川, 湖南岳阳, 四川万县、松潘以及贵州, 湖北和云南。