

绿褐嵌夜蛾 *Micardia pulcherrima* (Moore) (图版 XLI-53)

Leucania pulcherrima Moore, 1867, Proc. zool. Soc. Lond. p. 48, pl. 6, fig. 7. (大吉岭)

Eustrotia pulcherrima: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 574. —Chen, 1982,

Icon. Het. Sin. 3: 331. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.291. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.999.

Micardia pulcherrima: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 291.

翅展 28—31 mm。头、胸及前翅浅褐黄色；前翅前缘区红色，一白线自顶角内斜至亚中褶折角向后，此线折角处内侧褐色，近顶角红棕色，中脉后一白纵条，肾纹黑色，后缘区有火红色。中室至亚中褶绿褐色并由中室端向前延伸至近顶角，亚中褶基部一黑纹，肾纹黑色，中线黑褐色，亚端区有一褐色斜纹，其中有四条白纵纹；后翅浅黄色，外线微黑，翅外缘一列黑点；腹部灰黄带黑灰色。

分布 四川、西藏；不丹，印度。

红带嵌夜蛾 *Micardia munda* Leech (图版 XLI-54)

Micardia munda Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 138. (四川；Pu-tsu-fong)

Eustrotia munda: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 577, pl. 165, fig. 28.

Micardia munda: Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 3: 280.

翅展 30 mm。头部与胸部浅赭黄色带有霉绿色，触角有黑色环纹，下唇须基部白色，第二节外侧红色，翅基片内缘红色；前翅赭黄色，前缘区基部红色，前缘脉红色，一红色长纵条自中室基部外伸达顶角，其前缘中部微凹，后缘沿亚中褶外行至中部略外折角近直线达顶角，前后缘大部衬以银白色及黑色，缘毛红色，端部褐色；后翅白色带赭黄色，外线可见一列黑点，自 2 脉至 5 脉，端区翅脉纹浅褐色，缘毛淡赭黄色，顶角外缘毛端部褐色，中段缘毛的基部有褐纹；腹部赭黄色。

分布 四川。

谐夜蛾属 *Emmelia* Hübner

Emmelia Hübner, [1821] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 175.

Type-species: *Phalaena sulphuralis* Linnaeus.

Erotyla Hübner, 1822, Syst.-Alph. Verz. p. 22. 36.

Agrophila Boisduval, 1840, Ind. Meth. p. 175.

喙发达，下唇须斜向前伸，第二节微有鳞，第三节向前伸，额有圆形突起，中部有隆脊，下部有角质片，复眼大而圆，雄蛾触角有纤毛。胸部全被鳞片，无毛簇，胫节鳞片平滑；腹部基节有微小毛簇；前翅顶角圆形，外缘微曲，不呈锯齿形。