

前翅长：♂ 11 mm，♀ 12 mm。头和胸腹部背面黄褐色，掺杂白色；下唇须黄褐色。前翅红褐至褐色，由翅基至外线共有 12 条白线，其中亚基线两条，浅弧形；内线两条，在前缘下有一小折角；中线和外线各 4 条，中部外凸，其中外线中部凸出极强，最外侧一条紧邻亚缘线；中点黑褐色，紧邻第四条中线，其外侧有白色弧形环包围；亚缘线白色波状，较其内侧的线条略粗，在 M_1 处与一条由顶角发出的斜线汇合，在 Cu_1 处向外伸出一叉形小白斑与缘线接触，在 Cu_2 以下不连续；缘线深褐色，内侧略带白色；缘毛白色与红褐色掺杂。后翅灰红褐色，基半部无斑纹，无中点；端半部斑纹与前翅连续。前后翅反面中点深褐色，较大，周围具白色晕圈。♂ 前翅反面毛束灰黄色。

雄性外生殖器（图 572）：同属征描述。

检视标本：1♀，四川峨眉山，1 800—1 900 m，1957. VII. 6；1♀，同前，800—1 000 m，1957. V. 1；1♂，四川会理，1974. VII. 29。

分布：四川。

合小纹尺蛾 *Microlygris complicata* (Butler, 1879)

Cidaria complicata Butler, 1879, Illust. typical Specimens Lepid. Heterocera Colln Br. Mus. 3: 57, pl. 55: 4. (日本：横滨)

Microlygris porphyriata complicata: Prout, 1914, in Seitz, Macrolepid. World 4: 207, pl. 13: a.

Lobogonodes (Microlygris) complicata: Prout, 1937, ibidem 4 (Suppl.): 105.

Microlygris complicata: Inoue, 1982, Moths Japan 1: 486; 2: 282, pl. 72: 37, 38.

寄主植物：爬山虎。

分布：台湾；日本，朝鲜。

中国台湾记载下述亚种。

台湾亚种 subsp. *dactylotypa* (Prout, 1940)

Lobogonodes (Microlygris) complicata dactylotypa Prout, 1940, in Seitz, Macrolepid. World 12: 310, pl. 31: d. (台湾：Kanshirei)

近似眼点小纹尺蛾。前翅中点外侧无白环；前后翅外线以外逐渐过渡为黄褐色，亚缘线较细弱或不完整，顶角处无白色斜线。

未见标本。

分布：台湾。

角尺蛾属 *Lobogonodes* Bastelberger, 1909

Lobogonodes Bastelberger, 1909, Dt. ent. Z. Iris 22: 168.