

Mocis ancilla: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 153. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 359. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 849. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.1018.

翅展 37 mm。头部与胸部棕褐色；前翅棕色，基线双线暗棕色，自前缘脉至 1 脉，内线深棕色，为一窄带，在前缘区稍外凸，其后直线外斜，线内侧色较浅，中线波曲，肾纹窄曲，棕色边，外线暗棕色，微外弯，在 2 脉后微外突，亚端线双线暗棕色，锯齿形，外侧有一列黑点；后翅褐黄色，外线与亚端线暗褐色。雄蛾抱钩粗曲，阴茎长（图 631）。




图 631 奚毛胫夜蛾 *Mocis ancilla* (Warren) ♂ 外生殖器

幼虫头部黄白色，颅侧区中部一茶褐色弓形纹并有网状纹，身体灰褐色，亚背区有不规则褐纹。

寄主 葛。

分布 黑龙江、河北、山东、河南、江苏、浙江、湖南、福建；日本，朝鲜。

乱纹夜蛾属 *Anisoneura* Guenée

Anisoneura Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 160.

Type-species: *Anisoneura salebrosa* Guenée.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，第三节长，额平滑，复眼圆大，雄蛾触角有鬃毛及纤毛。胸部毛鳞混生，无毛簇；前、后足胫节无刺。腹部基部几节有毛脊。前翅前缘拱曲，顶角圆形，外缘曲度平稳，锯齿形，有副室。后翅中室约为翅长的 1/4，雄蛾 2 至 4，各脉上有剑状薄鳞，2 脉从中室后缘基部伸出，3 脉自中室后缘中部伸出。